СОГЛАСОВАНО

Руководитель ИЛЦ
ФБУН ГНЦ ПМБ

_____ М.В. Храмов
« » _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Дезон»

_____ И. Н. Гаров
« » _____ 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 6/2-22

по применению дезинфицирующего средства

«ДЕЗОН-Антисептик»

в качестве кожного антисептика и для быстрой дезинфекции поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (молочная, мясная, рыбная, птицеперерабатывающая, хлебобулочная, кондитерская, пивобезалкогольная, винодельческая, ликёроводочная)
(ООО «Дезон», Россия)

2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 6/2-22

по применению дезинфицирующего средства "ДЕЗОН-Антисептик"

в качестве кожного антисептика и для быстрой дезинфекции поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (молочная, мясная, рыбная, птицеперерабатывающая, хлебобулочная, кондитерская, пивобезалкогольная, винодельческая, ликёроводочная)

(ООО «Дезон», Россия)

Инструкция разработана: ФБУН ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии; «Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского» ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, ООО «Дезон».

Авторы: Кузин В.В., (ФБУН ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии); Носик Д.Н., Носик Н.Н. (Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского), Гаров И.Н. (ООО «Дезон»).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующее средство «ДЕЗОН-Антисептик» предназначено для:

- экстренной дезинфекции и очистки небольших по площади твердых поверхностей, в том числе труднодоступных в производственных, складских, вспомогательных, санитарных, бытовых и подсобных помещениях, технологического оборудования (упаковочное оборудование, вакуумное оборудование, линии розлива, упаковки, расфасовки весы, слайсеры и т.д..), его частей, аппаратуры, инвентаря (доски разделочные, ножи, мясорубки и др.) и посуды, тары (ёмкостей, поддонов, ящиков и т.д.), холодильных камер, холодильных установок, холодильных помещений и других объектов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (молочная, мясная, рыбная, птицеперерабатывающая, хлебобулочная, кондитерская, пивобезалкогольная, винодельческая, ликёроводочная, плодовоовощная, консервная, по производству дрожжей, детского питания, общественного питания, соков, напитков), аграрного сектора;
- дезинфекции и очистки, небольших по площади твердых поверхностей помещений и оборудования на предприятиях общественного питания (рестораны, бары, кафе, столовые и др.), продовольственной торговли (включая супермаркеты, рынки, плодоовощные базы, склады, овоще- и фруктохранилища);
- предметов обстановки и оборудования (дверные и оконные ручки, выключатели, жёсткая мебель, поручни, столы, в т. ч. обеденные, разделочные), санитарно-технического оборудования (ручки кранов и сливных бачков, сидения унитазов в туалетных комнатах, туалетных полочек, тумбочек и т.д.);
-дезинфекции средств индивидуальной защиты персонала;
- обеззараживания перчаток (из хлоропренового каучука, латекса, неопрена, нитрила и др. материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки персонала;
- дезинфекции обуви;
-дезинфекции резиновых, пластиковых и полипропиленовых ковриков;
- наружных поверхностей телефонных аппаратов, комплектующих устройств компьютеров (мониторы, компьютерная клавиатура, микрофон, принтер) и другой офисной техники, счетчиков банкнот, детекторов валют, архивных шкафов и стеллажей, осветительной аппаратуры, жалюзи и т.д.;
- наружных поверхностей кондиционеров, сплит-систем;
- холодильных камер, холодильных установок и холодильных помещений;
- дезинфекции и очистки небольших по площади твердых поверхностей на транспорте для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- поверхностей, пораженных плесневыми грибами;
- поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов и аппаратов в очагах инфекционных заболеваний, в т.ч. особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии);
− для гигиенической обработки рук работников вышеперечисленных учреждений.

1.2. Дезинфицирующее средство «ДЕЗОН-Антисептик» (далее – средство) выпускается в виде готовых к применению: жидкости, влажных пропитанных салфеток.

В качестве действующих веществ содержит 2-пропанол - 60,0%, 1-пропанол-10%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид 0,20% (суммарно), а также функциональные добавки. Может выпускаться с увлажняющими и ухаживающими за кожей компонентами и без них.

Средство «ДЕЗОН-Антисептик» в виде готовой к применению жидкости представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным запахом спирта и применяемой отдушки (или без отдушки). Допускается наличие слабой опалесценции.

Средство «ДЕЗОН-Антисептик» в виде готовых к применению салфеток «Дезинфицирующие салфетки «ДЕЗОН-Антисептик» представляет собой готовые к применению салфетки из белого нетканого материала различных размеров и разной плотности, равномерно пропитанные дезинфицирующим средством «ДЕЗОН-Антисептик».

Салфетки выпускают трех видов:

· в виде перфорированной ленты до 750 салфеток, сформированной в рулон и упакованной в герметичную упаковку – емкость-диспенсер (банки, ведра) соответствующего размера из плотного полимерного материала с двойными зажимными крышками (внутренняя крышка с функциональной прорезью для извлечения одной салфетки); для контроля первого вскрытия упаковка с салфетками запаяна сверху по окружности полимерной пленкой.

Сменный блок представляет собой перфорированную ленту из салфеток, сформированных в рулон и упакованных в пленку из мягких полимерных материалов.

· в пакетах из полимерных материалов до 450 салфеток в пакете с герметизирующим клапаном;

· в индивидуальных герметичных пакетах из трехслойного композиционного материала (полиэтилен, фольга, бумага) по 1 салфетке (упаковка “саше”).

Салфетки изготовлены из высококачественного, экологически безопасного материала. Обладают высокой прочностью, легко отрываются по линии перфорации, при использовании не рвутся, не оставляют ворса на обрабатываемой поверхности, обладают высокими влагоудерживающими свойствами.

Средство «ДЕЗОН-Антисептик» может использоваться в качестве пропиточного раствора для сухих салфеток, помещенных в диспенсерную систему.

Срок годности средства в виде жидкости и в виде салфеток – 6 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения. После вскрытия защитной пленки срок годности салфеток, упакованных в банку – 6 месяцев; после вскрытия салфеток, упакованных в пакет – 4 месяца при соблюдении условий хранения и применения. При высыхании салфеток их использование запрещается.

1.3. Дезинфицирующее средство «ДЕЗОН-Антисептик» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе бактерий группы кишечных палочек, золотистого стафилококка, стрептококков, сальмонелл, дрожжеподобных грибов, дрожжей – специфической микрофлоры предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, вирулицидной активностью (в том числе рино-, норо, рото-, аденовирусов, коронавирусов, полиомиелита, вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т. ч. гепатита А, В, С), энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ВИЧ, вирусов гриппа и парагриппа человека, вирусов «атипичной пневмонии» *(SARS*), вирусов герпеса, кори, вирусов «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1, цитомегаловирусной инфекции, вируса Эбола и.т.д), легионеллеза, фунгицидной активностью в отношении грибов рода *Candida, Trichophyton,* плесневых грибов, возбудителей особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии).

Средство обладает обезжиривающим действием, облегчает и ускоряет удаление жировых и пигментирующих загрязнений (в том числе застарелых) на обрабатываемых объектах.

Обладает дезодорирующими свойствами.

Не требует смывания после обработки.

1.3. По параметрам острой токсичности средство «ДЕЗОН-Антисептик» при введении в желудок и нанесении на кожу в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ. При введении в брюшину средство относится к 4 классу малотоксичных веществ по классификации К.К.Сидорова. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. Кумулятивный эффект отсутствует. Средство обладает раздражающим действием на оболочки глаза и дыхательных путей. По Классификации степени ингаляционной опасности дезинфицирующих средств при ингаляционном воздействии по зоне острого токсического действия средство в виде паров и аэрозоля в рекомендованных режимах применения относится к 4 классу малоопасных веществ.

ПДК в воздухе рабочей зоны:

ЧАС – 1,0 мг/м^3 (аэрозоль, 2 класс опасности).
Пропанола 1 и Пропанола -2 – 10 мг/м^3, 3 класс опасности (пары).

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1 **Средство «ДЕЗОН-Антисептик» в форме готовой к применению жидкости** применяется при помощи различных дозирующих устройств, способных дозировать заданное количество жидкости, методом орошения (с использованием распылительных насадок), методом протирания (с помощью пропитанных средством сухих салфеток из диспенсерной системы).

Средство «ДЕЗОН-Антисептик» в виде салфеток «Дезинфицирующие салфетки «ДЕЗОН-Антисептик», упакованных в емкость-диспенсер (полимерные банки или ведра), необходимо начинать использовать из центра рулона. Если в процессе использования крайняя салфетка высохла, ее необходимо выбросить и использовать следующую. Для предотвращения высыхания салфеток, банку следует сразу же закрыть крышкой после извлечения очередной салфетки.

Салфетки, упакованные в индивидуальную упаковку: перед применением вскрыть упаковку, извлечь и развернуть салфетку и сразу провести обработку.

2.2 **Гигиеническая обработка рук:** на сухие руки (без предварительного мытья водой и мылом) наносят не менее 2 мл средства и втирают его в кожу, обращая особое внимание на тщательность обработки кончиков пальцев, кожи вокруг ногтей, между пальцами или протирают одной дезинфицирующей салфеткой «ДЕЗОН-Антисептик», извлечённой из упаковки или салфеткой из диспенсерной системы «ДЕЗОН», обильно смоченной средством. Время дезинфекционной выдержки 20 секунд- до полного высыхания кожных покровов.

Время обработки при вирусных инфекциях - 1 мин.

2.3 **Дезинфекция поверхностей в помещениях,** труднодоступных поверхностей, объектов, указанных в п.1.1 настоящей инструкции, проводится способом протирания (использование салфеток) и способом орошения (при использовании флаконов с насадками-распылителями).

При проведении дезинфекции **способом орошения** поверхности равномерно увлажняют средством до полного смачивания с помощью распылительной насадки с расстояния 30-50 см. Норма расхода средства – от 30 мл/м^2 обрабатываемой поверхности.

При проведении дезинфекции **методом протирания** используют готовые дезинфицирующие салфетки «ДЕЗОН-Антисептик» или салфетки из диспенсерной системы, обильно смоченные средством. Обработка одной салфеткой проводится однократно. Одной салфеткой в зависимости от её размера и плотности можно обработать поверхность площадью не более 2 м^2**.** Для дезинфекции больших по площади поверхностей следует использовать несколько салфеток.

Поверхности, подлежащие дезинфекции, должны быть увлажнены средством полностью и равномерно по всей плоскости. Средство быстро высыхает, не оставляя следов на поверхности. Поверхности можно использовать после полного высыхания средства. В случае необходимости поверхности можно протереть салфеткой после окончания времени дезинфекционной выдержки, не дожидаясь высыхания.

Средство не рекомендуется применять для обработки поверхностей, покрытых лаком, низкосортными красками, из акрилового стекла и других материалов, не устойчивых к воздействию спирта. Перед применением рекомендуется проверить действие средства на небольшом малозаметном участке поверхности.

Дезинфекцию поверхностей можно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания. После обработки средством смывание с поверхностей, не контактирующих с пищевыми продуктами не требуется. После экспозиции поверхности, непосредственно контактирующие с пищевыми продуктами, дважды протирают салфеткой, обильно смоченной проточной водой. Мелкий инвентарь отмывают от остатков средства проточной водой. Смывание рабочих растворов средства с поверхностей, не контактирующих с пищей (пол, стены, двери, и пр.), не требуется.

Проветривание помещения после обработки не требуется

При наличии биологических загрязнений (органических и др.) на обрабатываемых поверхностях, необходимо одной салфеткой удалить загрязнение, а другой провести повторную обработку.

2.4 **Технологическое оборудование, инвентарь, посуду** и т.д. обрабатывают после предварительной очистки и мойки с использованием моющих средств, разрешённых к применению на предприятиях пищевой промышленности в установленном порядке. Наличие белково-жировых

загрязнений на поверхностях, подвергающихся дезинфекции недопустимо, так как это инактивирует действующие вещества и снижает эффект дезинфекции.

2.5 Вымытые поверхности вытирают сухой салфеткой или высушивают на воздухе до полного исчезновения следов воды, после чего обрабатывают средством «ДЕЗОН-Антисептик».

2.6 При дезинфекции мусорных баков, сантехники, а так же в тех случаях, когда требуется особая обработка поверхностей (при контакте с кровью, яйцом, сыром, мясом, птицей) проводится двукратная обработка средством.

2.7 Экстренную дезинфекцию поверхностей помещений, стеллажей, инвентаря, тары на плодоовощных базах, складах, овоще- и фруктохранилищах для предупреждения развития гнилостных бактерий проводят после их механической очистки. Время экспозиции после обработки средством «ДЕЗОН-Антисептик» 0,5 мин.

После экспозиции поверхности, непосредственно контактирующие с пищевыми продуктами, дважды протирают салфеткой, обильно смоченной проточной водой. Мелкий инвентарь отмывают от остатков средства проточной водой. Смывание рабочих растворов средства с поверхностей, не контактирующих с пищей (пол, стены, двери, и пр.) не требуется.

2.8 **Дезинфекция обуви**

Внутреннюю поверхность обуви оросить средством из распылителя до легкого увлажнения, либо протереть влажными салфетками или салфетками из диспенсерной системы, обильно смоченными средством, используя на одну пару обуви две салфетки. Затем протереть чистой бумажной салфеткой и дать высохнуть. Время дезинфекционной выдержки 3 мин.

2.9 **Дезинфекция резиновых ковриков**

Резиновые коврики оросить средством из распылителя либо протереть влажными салфетками или салфетками из диспенсерной системы, обильно смоченными средством и выдержать 3 мин.

2.10 **Обработка перчаток**, надетых на руки персонала: для обеззараживания поверхности перчаток в сжатую ладонь руки в перчатке наносят 3 мл средства. Затем в течение 15 секунд равномерно распределяют порцию средства по поверхности перчаток на обеих руках. Или обрабатывают стерильным ватным или марлевым тампоном, обильно пропитанным средством, или влажной салфеткой. Время дезинфекционной выдержки - не менее 1 минуты при бактериальных инфекциях, не менее 3-х минут при грибковых (Кандида, Трихофитон) инфекциях, не менее 5 минут при вирусных инфекциях

2.11 Профилактическую дезинфекцию оборудования и поверхностей **транспорта для перевозки пищевых продуктов** проводят способом орошения или протирания по режимам, эффективным в отношении бактериальных инфекций. После обработки средством смывание с поверхностей, в т. ч. контактирующих с пищевыми продуктами не требуется.

2.12. **Для борьбы с плесенью** поверхности в помещениях сначала очищают от плесени, просушивают, затем двукратно, с интервалом 5 минут, протирают дезинфицирующей салфеткой «ДЕЗОН-Антисептик» или салфеткой из диспенсерной системы «ДЕЗОН», обильно смоченной средством или обильно орошают средством. Время дезинфекционной выдержки после обработки 15 минут. Для предотвращения роста плесени в дальнейшем обработку повторяют через 1 месяц.

2.13. Экстренную дезинфекцию поверхностей помещений, стеллажей, инвентаря, тары на плодоовощных базах, складах, овоще- и фруктохранилищах для предупреждения развития гнилостных бактерий проводят после их механической очистки. Время экспозиции после обработки средством - 0,5 мин.

После экспозиции поверхности, непосредственно контактирующие с пищевыми продуктами, дважды протирают салфеткой, обильно смоченной проточной водой. Мелкий инвентарь отмывают от остатков средства проточной водой. Смывание рабочих растворов средства с поверхностей, не контактирующих с пищей (пол, стены, двери, и пр.) не требуется.

2.14. **Дезинфекцию поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов** и **аппаратов, медицинских инструментов в очагах чумы, холеры, туляремии** проводят по режимам при особо опасных инфекциях, представленным в таблице 1, 3 способом погружения или обильного орошения.

2.15 **Применение средства «ДЕЗОН-Антисептик» в качестве пропиточного раствора диспенсерной системы с сухими салфетками.**

Для приготовления салфеток к использованию открывают крышку ёмкости-диспенсера с салфетками, и равномерно, в верхнюю часть рулона аккуратно заливают средство «ДЕЗОН-Антисептик» из расчета для салфеток плотностью >30 г/м^2 3 мл средства на каждые 100 см^2 площади салфеток в рулоне, для

салфеток плотностью < 30 г/м^2 - 1,5 мл средства на каждые 100 см^2 площади салфеток в рулоне), крышку банки плотно закрывают и оставляют на 10-20 мин при комнатной температуре, за это время все салфетки должны быть полностью пропитаны дезинфекционным средством. Количество пропитки должно быть достаточным, чтобы салфетки полностью пропитались и раствор ещё оставался на дне ёмкости-диспенсера.

После этого заполнить и наклеить на ёмкость-диспенсер формуляр с указанием наименования средства «ДЕЗОН-Антисептик», размера салфеток, количеством салфеток в упаковке, дату пропитки салфеток, срок годности. По истечении 10-20 мин. крышку открыть, аккуратно продеть первую салфетку из середины рулона сквозь прорезь в крышке диспенсера и плотно закрыть крышку. Салфетки готовы к применению.

После извлечения необходимого количества салфеток ёмкость-диспенсер следует сразу же закрыть крышкой во избежание высыхания салфеток.

В процессе использования салфеток необходимо следить за количеством раствора в емкости-диспенсере, во избежание его высыхания.

Срок годности салфеток, пропитанных средством - 6 месяцев.

Использование влажных салфеток из диспенсерной системы в качестве кожного антисептика и для дезинфекции поверхностей проводится аналогично использованию готовых влажных салфеток «ДЕЗОН-Антисептик».

Таблица 1

Режимы дезинфекции поверхностей из различных материалов дезинфицирующим средством «ДЕЗОН-Антисептик» в виде жидкости и в виде влажных салфеток

Объект обеззараживания	Вид инфекции	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в производственных помещениях, предметы обстановки, жёсткая мебель, технологическое оборудование, разделочные столы, полки, инвентарь, поверхности на транспорте для перевозки пищевых продуктов	Бактериальные	0,5	Орошение или протирание, использование салфеток
	Кандидозы	1	
	Дерматофитии	3	
	Вирусные	5	
	Особо опасные инфекции (чума, холера, туляремия)	3	Погружение, обильное орошение
	Легионеллез	3	Орошение или протирание, использование салфеток
	Плесень	15	Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 5 минут, использование салфеток
Санитарно-техническое оборудование (ручки кранов и сливных бачков, сидения унитазов в туалетных комнатах, туалетных полочек, тумбочек и др.)	Бактериальные, кандидозы, дерматофитии	1	Двукратное орошение или двукратное протирание, использование салфеток

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Средство использовать только по назначению.

3.2. Не использовать для обработки ран и слизистых оболочек.

3.3. Избегать попадания пропиточного раствора в глаза.

3.4. Не обрабатывать поверхности объектов, портящиеся от воздействия спиртов. Перед применением рекомендуется проверить действие средства на небольшом малозаметном участке поверхности.

3.5. Обработку поверхностей в норме расхода проводить без средств защиты органов дыхания. При превышении нормы расхода рекомендуется использовать универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки А и защитные очки.

3.6. По истечении срока годности или при высыхании салфеток, а также при неправильном хранении их использование запрещается.

3.7. Средство пожароопасно! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами. Не допускается держать ёмкости с препаратом открытыми, работать вблизи источников нагрева и открытого огня. Не курить!

3.8. Средство должно применяться непосредственно из оригинальной упаковки изготовителя. Разбавление средства водой или другими растворителями, а также смешивание с другими средствами не допускается.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 1-2 капли 30% раствор сульфацила натрия.

4.2. При появлении на коже раздражения, сыпи – прекратить применение средства, руки вымыть водой с мылом.

4.3. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Дать теплое питье. Рот и носоглотку прополоскать водой.

4.4. При попадании средства в желудок промыть желудок большим количеством воды, вызвать рвоту. Затем принять активированный уголь (10-12 измельченных таблеток).

4.5. При необходимости обратиться к врачу.

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Средство выпускается в полимерной таре вместимостью от 0,05 до 1,5 $дм^3$, в том числе с насадками-распылителями и дозирующими устройствами, флаконах с евродозаторами вместимостью 0,5 и 1 $дм^3$, канистрах полимерных вместимостью до 50 $дм^3$, в бочках полиэтиленовых вместимостью до 250 $дм^3$ с крышкой и прокладкой, обеспечивающими сохранность продукта, ёмкостях 1 $м^3$ с крышкой и прокладкой.

Салфетки выпускают трех видов:

- в виде перфорированной ленты до 750 салфеток, сформированной в рулон и упакованной в герметичную упаковку – емкость-диспенсер (банки, ведра) соответствующего размера из плотного полимерного материала с двойными зажимными крышками (внутренняя крышка с функциональной прорезью для извлечения одной салфетки).

Сменный блок из салфеток, сформированных в рулон, упаковывают в пленку из мягких полимерных материалов

- в пакетах из полимерных материалов до 450 салфеток в пакете с герметизирующим клапаном;
- в индивидуальных герметичных пакетах из трехслойного композиционного материала (полиэтилен, фольга, бумага) по 1 салфетке (упаковка “саше”).

5.2. Дезинфицирующее средство «ДЕЗОН-Антисептик» транспортируют всеми видами наземного транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на этих видах транспорта и гарантирующими сохранность продукта и тары. Температура транспортирования от минус 40ºС до плюс 40ºС.

5.3. Дезинфицирующее средство «ДЕЗОН-Антисептик» хранят в плотно закрытой упаковке производителя в крытых вентилируемых складских помещениях, в соответствии с правилами хранения легковоспламеняющихся жидкостей, отдельно от лекарственных средств, в местах недоступных детям, при температуре не ниже минус 40°С и не выше плюс 40°С, вдали от нагревательных приборов и

открытого огня, прямых солнечных лучей.

5.4. В аварийной ситуации (при нарушении целостности потребительской упаковки) салфетки необходимо засыпать песком или землей (не использовать горючие материалы), собрать в емкости с крышкой и отправить на утилизацию. При уборке следует использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена; для защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки А или промышленный противогаз.

5.5. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

5.6. Срок годности средства в виде жидкости и в виде салфеток – 6 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения.

После вскрытия защитной пленки салфеток, упакованных в банку – 6 месяцев. После вскрытия салфеток, упакованных в пакет – 4 месяца при соблюдении условий хранения и применения. При высыхании салфеток их использование запрещается.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. По показателям качества дезинфицирующее средство «ДЕЗОН-Антисептик» должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблицах 4,5.

Таблица 2

Показатели качества дезинфицирующего средства «ДЕЗОН-Антисептик» в виде жидкости.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Метод испытаний по ТУ 20.20.14 -006-17643541-2017
1	Внешний вид	Готовая к применению бесцветная или окрашенная в интенсивный (оранжевый, розовый, зелёный) цвет жидкость. Допускается наличие слабой опалесценции и незначительного количества осадка.	п.5.1
2	Запах	Характерный запах спирта и/или применяемой отдушки	п.5.1
3	Массовая доля 2-пропанола, %	60,0 ± 3,0	п.5.2
4	Массовая доля 1-пропанола, %	10,0 ± 1,0	п.5.2
5	Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (суммарно), %	0,2 ±0,05	п.5.3

Таблица 5

Показатели качества дезинфицирующего средства «ДЕЗОН-Антисептик» в виде салфеток «Дезинфицирующие салфетки «ДЕЗОН-Антисептик».

<table>
<tr><th rowspan="2">№ п/п</th><th rowspan="2">Наименование показателей</th><th colspan="3">Норма</th><th rowspan="2">Метод испыта-ний по ТУ 20.20.14 - 006-17643541-2017</th></tr>
<tr><th>Упаковка в ёмкость диспенсер</th><th>Упаковка в пакеты</th><th>Упаковка индивидуальная «саше»</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Внешний вид салфеток</td><td>Находящиеся в рулоне равномерно пропитанные салфетки из белого нетканого материала, упакованные в герметичную упаковку - емкость диспенсер (банки, ведра)</td><td>Находящиеся в стопке равномерно пропитанные салфетки из белого нетканого материала, сложенные методом Z или Cross folk, упакованные в пакеты из полимерных материалов с герметизирующим клапаном</td><td>Равномерно пропитанная раствором салфетка из белого нетканого материала, упакованная в пакет из трехслойного композиционного материала (полиэтилен, фольга, бумага)</td><td>п. .5.1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Запах</td><td colspan="3">Характерный запах спирта и/или применяемой отдушки</td><td>п. 5.1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Количество салфеток в упаковке, шт.</td><td colspan="3">Согласно информации на упаковке</td><td>п. 5.7</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Размер салфеток: длина, ширина , мм</td><td colspan="3">Согласно информации на упаковке</td><td>п. 5.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">Масса пропиточного раствора на 100 см^2 площади салфетки, г</td><td colspan="3">для салфеток плотностью >30 г/м^2
2,2 ± 0,5</td><td rowspan="2">п. 5.4</td></tr>
<tr><td colspan="3">для салфеток плотностью <30 г/м^2
1,0 ± 0,3</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Массовая доля 2-пропанола в пропиточном составе %</td><td colspan="3">60,0 ± 3,0</td><td>п. 5.2</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Массовая доля 1-пропанола в пропиточном составе %</td><td colspan="3">10,0 ± 1,0</td><td>П.5.2</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Массовая доля алкилдиметилбензил-аммоний хлорида и дидецилди-метиламмоний хлорида (суммарно) в пропиточном составе %</td><td colspan="3">0,2 ±0,05</td><td>п. 5.3</td></tr>
</table>