СОГЛАСОВАНО

Руководитель ИЛЦ
ФБУН ГНЦ ПМБ

_____ М.В. Храмов
«27» апреля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Дезон»

_____ А. В. Лёвин
«27» апреля 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 28/1-23

по применению средства дезинфицирующего с моющим действием
«ДЕЗОН D102 (гипохлор)»
(ООО «Дезон», Россия)

для целей дезинфекции в медицинских организациях и лечебно-профилактических организациях, в инфекционных очагах, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, в учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта, социального обеспечения, санаторно-курортного хозяйства, детских учреждениях.

Москва
2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 28/1-23

по применению средства дезинфицирующего с моющим действием «ДЕЗОН D102 (гипохлор)», ООО «Дезон», Россия

для целей дезинфекции в медицинских организациях и лечебно-профилактических организациях, в инфекционных очагах, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, в учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта, социального обеспечения, санаторно-курортного хозяйства, детских учреждениях

Инструкция разработана: ФБУН ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии; «Институт вирусологии им. Д.И.Ивановского» ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России, ООО «Дезон»

Авторы: Кузин В.В. (ФБУН ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии), Носик Д.Н., Носик Н.Н. (Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России), А. В. Лёвин (ООО «Дезон»).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Дезинфицирующее средство с моющим действием «ДЕЗОН D102 (гипохлор)», далее по тексту «ДЕЗОН D102», представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета с характерным запахом хлора. Допускается наличие опалесценции и незначительного количества осадка.

В качестве действующих веществ содержит гипохлорит натрия с массовой долей активного хлора - 6,0%. Кроме того, в состав средства входят щелочные компоненты, неионогенные поверхностно-активные вещества, обеспечивающих моющее и обезжиривающее действие, ингибитор коррозии для предотвращения коррозии инструментов из металлов, включая углеродистые стали и сплавы, сплавов титана, стабилизаторы и другие функциональные компоненты.

Показатель активности водородных ионов (pH) 1% водного раствора – 12,0±1,0.

Плотность средства при 20^0C - 1,2 ± 0,1 г/см^3

В зависимости от входящего в состав ПАВ выпускают варианты пенной и беспенной модификации средства «ДЕЗОН D102».

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 1,5 года, рабочих растворов – до 14 суток при условии их хранения в закрытой стеклянной, пластмассовой или эмалированной (без повреждения эмали) емкости при комнатной температуре в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.

В течение гарантийного срока хранения допускается снижение концентрации активного хлора на 2%.

1.2.Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на *Mycobacterium terrae*), возбудителей внутрибольничных инфекций (ВБИ), включая *Pseudomonas aeruginosa,* кишечных инфекций- *Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium,* метициллин-резистентный стафилококк и ванкомицин-резистентный энтерококк); анаэробных инфекций, вирулицидной активностью (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, включая рино-, норо-, рото-, -энтеро, аденовирусы, коронавирусы, вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов (в т. ч. гепатита А, В, С), полиомиелита, энтеровирусов Коксаки, ECHO, ВИЧ, вирусов гриппа и парагриппа человека и др. возбудителей острых респираторных инфекций, коровьей оспы, бычьего коронавируса, вируса бычьей диареи BVBV, вирусов «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), вирусов герпеса, кори, цитомегаловирусной инфекции, вируса Эбола и т.д.), легионеллеза, фунгицидной активностью в отношении грибов рода *Candida, Trichophyton*, плесневых грибов (тестировано на *Aspergillus brasiliensis , Mucor spp.)*, возбудителей особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы), спороцидной активностью и овоцидным действием (в отношении цист и ооцист, яиц, онкосфер, личинок остриц и др. гельминтов).

Средство обладает выраженными моющими, отбеливающими и обезжиривающими свойствами, что позволяет совмещать очистку обрабатываемых поверхностей с их дезинфекцией, не фиксирует органические соединения. Удаляет типичные бытовые, пищевые и промышленные загрязнения (пятна и налеты жира, масла, сажи, белковых отложений и многих других трудноудалимых веществ) с пористых и непористых поверхностей из любых материалов (стекло, зеркала, металлы, керамика, ковры, кожа, хромированные изделия, бетон, кафель, резина,

пластик, винил, фарфор, фаянс и другие, в том числе пористые), удаляет запахи домашних животных, табака, пищи и пищевых отходов (мусорные баки).

Совместимо с различными материалами (керамическая плитка, натуральный и искусственный камень, ПВХ, линолеум, стеклянно-зеркальные поверхности, пластиковые, деревянные, металлические покрытия, бетон, резина, пластик кафель, фарфор, фаянс и другие).

Средство не совместимо с кислотами.

Рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны.

Средство полностью биоразлагаемо и экологически безопасно.

Сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

1.3 Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу мало опасных при нанесении на кожу; по классификации К.К.Сидорова при парентеральном введении (в брюшную полость) - к 4 классу мало токсичных веществ; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) мало опасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (4 класс опасности); оказывает местно-раздражающее действие на кожу и вызывает выраженное раздражение слизистых оболочек глаз (возможно повреждение роговицы). Средство не обладает мутагенным, канцерогенным, эмбриотоксическим и тератогенным действием.

ПДК хлора в воздухе рабочей зоны – 1 мг/м^3.

1.4. Средство «ДЕЗОН D102 (гипохлор)» предназначено для:

- дезинфекции, в том числе при совмещении с процессом мытья в помещениях (полы, стены, двери, подоконники и т.д.), жесткой и мягкой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы, писсуары, биотуалеты), включая ножные, лечебные, грязевые, минеральные, гидромассажные ванны для бесконтактного массажа, и пр., белья (нательного, постельного, спецодежды персонала и др.), посуды (в том числе одноразовой и лабораторной), аптечной, столовой, предметов для мытья посуды, кухонного оборудования и инвентаря (кастрюли, сковородки, мясорубки и др.), резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви из различных материалов, уборочного инвентаря и материала (щетки, ерши, ветошь, МОПы и т. д.), игрушек, спортивного инвентаря, предметов ухода за больными (грелки, подкладные клеенки, термометры, банки, наконечники для клизм, пузыри для льда, судна и др.), предметов личной гигиены в медицинских организациях (МО) и лечебно- профилактических организациях (ЛПО) любого профиля, на санитарном транспорте, в том числе машинах скорой медицинской помощи, в детских дошкольных, школьных и других общеобразовательных и оздоровительных учреждениях и организациях, пенитенциарных учреждениях при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции;

-поверхностей стационарного и передвижного лечебного и диагностического оборудования, дезинфекции комплектующих деталей наркозно-дыхательной и ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования, оборудования для гемодиализа, наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования, в т.ч. насадки, поверхности панелей управления медицинского оборудования, диагностических датчиков, в т.ч. датчиков к аппаратам УЗИ, кардиоэлектродов (клемм, насадок, клипс, электродов для грудных отведений);

- дезинфекции барокамер и приспособлений к ним;

-дезинфекции бактерицидных камер для хранения стерильных инструментов (внешние поверхности);

-оборудования, включая реанимационные, операционные, манипуляционные, родильные и пеленальные столы, гинекологические и стоматологические кресла, кровати, реанимационные матрацы и пр.;

- дезинфекции медицинских изделий, включая хирургические и стоматологические инструменты и материалы;

- дезинфекции инструментов и оборудования парикмахерских, косметических и массажных салонов, солярий, маникюрно-педикюрных кабинетов и т.д. (инструменты маникюрные, педикюрные, для косметических процедур, для стрижки, ванны для ног и ванночки для рук, электроды к косметическому оборудованию и приборы и т. д.);

- медицинских отходов класса Б и В из текстильных и других материалов (использованный перевязочный материал, одноразовое постельное и нательное белье, одежда персонала, лабораторной посуды однократного применения, медицинские изделия однократного применения, ампулы и шприцы после проведения вакцинации и пр.) перед их утилизацией; контейнеров и оборудования для сбора медицинских отходов; остатков пищи;

- биологических жидкостей и выделений в емкостях и на поверхностях (кровь, в т. ч. со сгустками, кровь донорская, препараты крови с истекшим сроком годности, компоненты крови, плазма и пр., мокрота, рвотные массы, моча, фекалии, слизи, сыворотка, эритроцитарная масса, околоплодные воды и др.), смывных жидкостей (эндоскопические, после ополаскивания зева), вакцин с просроченным сроком годности (в том числе БЦЖ) передих утилизацией; посуды и поверхности из-под выделений больного; материалов и инструментов, загрязненных выделениями, в т. ч. кровью, патологоанатомических и органических операционных отходов (органы, ткани и т.п.), всех отходов из инфекционныхотделений (в т. ч. пищевых);дезинфекции пиявок после проведения гирудотерапии (классифицируются как медицинские отходы класса Б);

-для профилактической дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (воздуховоды, вентиляционные шахты, решетки и поверхности вентиляторов вентиляционных систем, поверхности кондиционеров и конструктивных элементов систем кондиционирования помещений, сплит-систем, мультизональных сплит-систем, крышных кондиционеров, камер очистки и охлаждения воздуха кондиционера, воздуховодов систем вентиляции помещений, воздушные фильтры систем кондиционирования воздуха и систем вентиляции и т.п.);

- для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических, детских дошкольных, школьных и других общеобразовательных и оздоровительных учреждениях, на спортивных и коммунальных объектах и других учреждениях;

- дезинфекции, в том числе при совмещении с процессом мытья поверхностей и оборудования:

- на предприятиях парфюмерно-косметической, химико-фармацевтической, биотехнологической и микробиологической промышленности;

- на ветеринарных объектах, птицеводческих, животноводческих, звероводческих хозяйствах;

- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, солярии, сауны, парикмахерские, салоны красоты, косметические кабинеты, массажные салоны, общественные бани, бассейны, аквапарки, прачечные, общественные туалеты и другие объекты сферы обслуживания населения, жилищный фонд - подъезды домов, лифты, подвалы и т.д.); в детских школьных и дошкольных учреждениях, учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта, административных учреждениях (культурно-оздоровительные комплексы, офисы, спорткомплексы, кинотеатры, музеи, офисы, банки и банковские терминалы и др.); на объектах курортологии (домах отдыха, пансионаты, санатории и др.); в учреждениях социального обеспечения (дома для инвалидов, престарелых, хосписы и др.), в местах массового скопления людей;

- на предприятиях общественного питания, в пищеблоках медицинских и других организаций, продовольственной торговли (рестораны, бары, кафе, столовые, включая супермаркеты, рынки, плодоовощные базы, склады, овоще- и фруктохранилища);

- в производственных, складских, вспомогательных, санитарных, бытовых и подсобных помещениях, выложенных кафелем стен и напольных покрытий, наружных и внутренних поверхностей технологического оборудования (трубопроводов, резервуаров-охладителей, ёмкостей, теплообменников, линий розлива, упаковки, расфасовки, ванн различного назначения, арматуры, насосов, конвееров, кутеров, волчков и т. д.), его частей, аппаратуры, инвентаря (доски разделочные, ножи, мясорубки и др.) и посуды, тары (фляги, бидоны, корзины, ящики, поддоны, формы и т.п.) и других объектов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (молочная, мясная, рыбная, птицеперерабатывающая, хлебобулочная, кондитерская, пивобезалкогольная, винодельческая, ликёроводочная, по переработке и консервированию фруктов и овощей, по производству продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов, по производству дрожжей, детского питания, общественного питания, соков, напитков), аграрного сектора;

- на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья, молоковозов;

- на объектах МЧС, ФСБ, ФСО, Минобороны, личного состава войск и формирований ГО, в Вооруженных силах и Спасательных службах и др. воинских учреждениях;

- на объектах транспортной системы, на всех видах общественного транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы, поезда дальнего следования, вагоны - рестораны и буфеты, электрички, пригородные экспрессы, вагоны метрополитена, вокзалы, станции и т.д.), авиации, речного и морского флота; кабин и отсеков воздушных судов гражданской авиации;

- в медицинских вытрезвителях, санпропускниках, спецприемниках для лиц без определенного места жительства;

- дезинфекции, мойки и дезодорации холодильных камер, холодильных установок и холодильных помещений на предприятиях и в учреждениях любого профиля, в т. ч. пищевого;

- дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов, транспорта для перевозки твердых и жидких бытовых отходов;

- обеззараживания содержимого накопительных баков автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных туалетов и биотуалетов;

- для пропитывания дезинфицирующих ковриков, дезматов и дезбарьеров;

-для дезинфекции поверхности скорлупы яиц перед употреблением в пищу в лечебно-профилактических учреждениях, госпиталях, хосписах, детских дошкольных учреждениях и т. д.; для обеззараживания яиц на птицефабриках перед отправкой в торговую сеть, перед закладкой в инкубаторы; для обеззараживания яиц в лабораториях перед выполнением работ по получению куриных эмбрионов;

- для обработки поверхностей в помещениях в целях борьбы с плесенью и профилактики поражения поверхностей плесневыми грибами;

- для обеззараживания (дезинвазии) почвы, поверхностей и объектов в помещениях, в т.ч. лабораторного оборудования и мебели, предметов ухода за больными, игрушек, посуды, белья, лабораторной посуды, посуды из-под выделений, сборников медицинских отходов, уборочного инвентаря и материалов, перчаток резиновых и пр., контаминированных возбудителями паразитарных болезней (цистами и ооцистами, яйцами и личинками гельминтов, остриц);

- для пропитывания салфеток, помещенных в диспенсерную систему и последующего использования их для обработки небольших по площади поверхностей;

- для профессионального применения персоналом учреждений и клининговых компаний;

- для использования населением в быту.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Растворы средства «ДЕЗОН D102 (гипохлор)» готовят в емкости из любого материала, устойчивого к воздействию активного хлора (стеклянные, пластмассовые, эмалированные без повреждения эмали) путем смешивания средства с питьевой водой в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

Внимание! Долгое хранение высококонцентрированных растворов средства в стеклянных емкостях может вызвать помутнение стекла.

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства «ДЕЗОН D102 (гипохлор)»

Концентрация рабочего раствора		Количество средства «ДЕЗОН D102 (гипохлор)» и воды необходимые для приготовления рабочего раствора объемом:					
		1 л		10 л		100 л	
по препарату, %	по активному хлору%	Средство, мл	Вода, мл	Средство, мл	Вода, мл	Средство, мл	Вода, л
0,2	0,012	2,0	998,0	20,0	9980,0	200,0	99,80
0,25	0,015	2,5	997,5	25,0	9975,0	250,0	99,750
0,3	0,018	3,0	997,0	30,0	9970,0	300,0	99,70
0,5	0,03	5,0	995,0	50,0	9950,0	500,0	99,500
1,0	0,06	10,0	990,0	100,0	9900,0	1000,0	99,000

2,0	0,12	20,0	980,0	200,0	9800,0	2000,0	98,000
3,0	0,18	30,0	970,0	300,0	9700,0	3000,0	97,000
4,0	0,24	40,0	960,0	400,0	9600,0	4000,0	96,000
5,0	0,3	50,0	950,0	500,0	9500,0	5000,0	95,000
6,0	0,36	60,0	940,0	600,0	9400,0	6000,0	94,000
8,0	0,48	80,0	920,0	800,0	9200,0	8000,0	92,000
10,0	0,6	100,0	900,0	1000,0	9000,0	10000,0	90,000
15,0	0,9	150,0	850,0	1500,0	8500,0	15000,0	85,000

* - активный хлор в рабочем растворе рассчитан исходя из концентрации активного хлора в концентрате равным 6%.

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА ДЕЗОН D102 (ГИПОХЛОР)» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1. Растворы средства применяют для дезинфекции и мытья объектов, указанных в п.1.4 данной Инструкции. Средство применяют для дезинфекции и мытья поверхностей из различных щелочестойких материалов: металлов (чёрного, цветного, нержавеющей стали), пластмасс, дерева (защищённого лаком, водоотталкивающими полиролями или окрашенного водостойкими красками), стекла, кафельных и керамических плиток, резин, тканых материалов, пропитанных водоотталкивающими покрытиями (клеёнки, скатерти) и др.

3.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения и орошения. Обеззараживание объектов способом протирания можно проводить в присутствии больных с защитой кожи рук резиновыми перчатками. Обработку поверхностей и объектов растворами средства способом орошения проводить в отсутствии людей и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы) и глаз (защитные очки).

3.3. Дезинфекцию (обеззараживание) объектов способами протирания, замачивания, погружения можно проводить в присутствии людей со средствами защиты органов дыхания. Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл/м^2 обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл/м^2 при использовании гидропульта, «Автомакса» или 150 мл/м^2 при использовании распылителя типа «Квазар»; при обработке поверхностей, имеющих пористость, шероховатости и неровности, норма расхода 150 мл/м^2, при этом поверхности чистят щетками, смоченными в растворе средства.

3.4. Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 150 мл/м^2 обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения – 300 мл/м^2 (гидропульт, «Автомакс»), 150 мл/м^2 (распылитель типа «Квазар»).

3.5. Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства.

3.6. Предметы ухода за больными (кислородные маски, рожки от кислородной подушки, термометры, грелки, наконечники для клизм, подкладные клеёнки, пузыри для льда, судна, мочеприемники и др.), средства личной гигиены, спортивный инвентарь полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой водой.

3.7. Игрушки (за исключением мягких) полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, препятствуя их всплытию или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Крупные игрушки допустимо обрабатывать способом орошения. По окончании дезинфекции мелкие игрушки промывают проточной водой в течение 3 мин., крупные протирают ветошью, смоченной водой.

3.8. Посуду лабораторную, аптечную (пробирки, пипетки, колбы, предметные, покровные стёкла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа, резиновые груши, пластмассовые и резиновые пробки и т.д.) и столовую (в т.ч. с остатками пищи), полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2 л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки или губки. Благодаря высоким обезжиривающим свойствам средства «ДЕЗОН D102» возможно совмещение процессов обезжиривания, мытья и дезинфекции в одном процессе. Одноразовую посуду после дезинфекции утилизируют. Предметы для мытья посуды погружают

в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

Кухонное оборудование (разделочные, раздаточные столы и др.) клеёнки, скатерти, кухонный инвентарь (доски разделочные, лотки, ножи, мясорубки и др.) протирают тканью (салфетками), смоченной раствором средства, или погружают в рабочий раствор. Поверхности, соприкасающиеся с продуктами питания, по окончании дезинфекции промывают питьевой водой и дают высохнуть.

3.9. Белье в т.ч. загрязненное выделениями и остатками пищи замачивают в рабочемрастворе так, чтобы оно было полностью покрыто слоем средства (4-5 литров рабочегораствора на 1 кг сухого белья). По окончании дезинфекционной выдержки белье стираюти прополаскивают до исчезновения пены.

Внимание! Средство обладает отбеливающими и осветляющими свойствами. Не применять для цветных тканей.

3.10. Внутреннюю поверхность обуви из различных материалов в отношении возбудителей грибковых инфекций обеззараживают по режимам таблицы 5. По окончании дезинфекции обработанную поверхность протирают водой и высушивают. Банные сандалии, тапочки обеззараживают способом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой.

3.11. Поверхности стационарного и передвижного лечебного и диагностического оборудования, приборов и комплектующих деталей, в том числе наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования, оборудования для гемодиализа, наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования, в т.ч. насадки, поверхности панелей управления медицинского оборудования, оптических приборов и оборудования, барокамеры, диагностических датчиков, в т.ч. датчиков к аппаратам УЗИ обрабатывают по режимам, представленным в таблицах 2-6. Комплектующие детали (эндотрахеальные трубки, трахеотомические канюли, ротоглоточные воздуховоды, лицевые маски, анестезиологические шланги) погружают в раствор средства на время экспозиции. После окончания дезинфекции их извлекают из емкости с раствором и отмывают от остатков средства последовательно в двух порциях стерильной питьевой воды по 5 мин в каждой, затем сушат и хранят в асептических условиях.

3.12 Дезинфекцию датчиков УЗИ проводят протиранием ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 100 мл/м^2 или погружением в емкость с рабочим раствором средства до уровня горизонтальной отметки на поверхности датчика в соответствии с режимами, указанными в таблицах 2-6. По окончании дезинфекции датчики отмывают от остаточных количеств средства путем промывания проточной водой в течение 5 минут, далее их высушивают с помощью мягких салфеток.

3.13. Дезинфекцию медицинских изделий, в том числе совмещенную с их предстерилизационной очисткой, осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях с закрывающимися крышками. Рекомендуется проводить обработку любых медицинских изделий с соблюдением противоэпидемических мер с использованием средств индивидуальной защиты персонала.

Медицинские изделия, инструменты парикмахерских, салонов красоты, маникюрных и педикюрных кабинетов и пр. необходимо полностью погружать в рабочий раствор средства. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок. Через каналы поочередно прокачивают раствор средства и продувают воздухом с помощью шприца или иного приспособления. Процедуру повторяют несколько раз до полного удаления биологических загрязнений.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя средства над изделиями должна быть не менее 1 см.

После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из емкости и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 5 мин, обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или электроотсоса), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

3.14. Для борьбы с плесневыми грибами объекты сначала тщательно очищают с помощью щетки, затем обрабатывают раствором средства согласно режимам, указанным в таблице 7. Для предотвращения роста плесени в дальнейшем обработку повторяют через 1 месяц.

3.15. Уборочный инвентарь, МОПы замачивают в рабочем растворе средства в емкости по режимам таблиц 2-6.

3.16. Дезинфекцию (обезвреживание) медицинских отходов в МО и ЛПО, объектов санитарного транспорта, а также лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 группами патогенности, и других учреждений производят с учетом требований действующей нормативной документации по режимам табл.10

3.16.1 Медицинские отходы из текстильных и других материалов (использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны, одноразовое нательное и постельное белье, одежда персонала, маски, медицинские изделия однократного назначения и пр.) полностью погружают в рабочий раствор средства на время дезинфекционной выдержки. По окончании дезинфекции отходы утилизируют.

3.16.2 Дезинфекцию медицинских изделий однократного применения (в том числе ампул и шприцов после проведения вакцинации) осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. Обеззараживание шприцев инъекционных однократного применения проводят в соответствии с МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения».

При проведении дезинфекции изделия полностью погружают в раствор средства. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. После окончания дезинфекции изделия извлекают из емкости с раствором и утилизируют.

3.16.3 Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов обрабатывают способом протирания или орошения.

3.16.4 Жидкие отходы, смывные воды (включая эндоскопические смывные воды), кровь, сыворотку, выделения больного (мокрота, рвотные массы, моча, фекалии и пр.) смешивают с рабочим раствором необходимой для дезинфекции концентрации (табл.10). Дезинфицирующий раствор заливается непосредственно в емкость или на поверхность, где находится биологический материал. Далее полученная смесь выдерживается согласно используемому режиму обеззараживания (табл.10). Во время дезинфекции в емкости, последняя должна быть закрыта крышкой. Все работы персоналу проводить в резиновых перчатках, соблюдая противоэпидемические правила.

После окончания дезинфекционной выдержки смесь обеззараженной крови (выделений) и рабочего раствора средства подвергается утилизации как медицинские отходы с учетом требований действующей нормативной документации. При отсутствии других возможностей утилизации смесь обеззараженной крови (выделений) и рабочего раствора средства может быть слита в канализацию.

3.16.5. Посуду из-под выделений больного, лабораторную посуду или поверхность, на которой проводили дезинфекцию и сбор биологического материала, обрабатывают способом погружения (посуда) или протирания (поверхности). Затем посуду из-под выделений больного, лабораторную посуду или поверхности ополаскивают под проточной водой или протирают чистой ветошью, смоченной водой.

3.16.6. Вакцины, включая БЦЖ, при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности обеззараживают и утилизируют согласно методикам, изложенным в МУ 3.3.2.1761-03.

В соответствии с действующими документами непригодную для использования донорскую кровь и препараты крови утилизируют с использованием автоклавирования. Однако кровь со сгустками, донорскую кровь и препараты крови не зараженную, но с истекшим сроком годности допускается дезинфицировать путем смешивания с рабочим раствором средства в соотношении

1 часть крови на 2 части раствора по режимам табл. 9. Смесь выдерживают в течение времени экспозиции и утилизируют с учетом требований действующей нормативной документации. Медицинские пиявки после проведения гирудотерапии (классифицируются как медицинские отходы класса Б) погружают в рабочий раствор средства на время экспозиции, затем утилизируются с учетом требований действующей нормативной документации.

3.17. Дезинфекция крови и биологических выделений больных осуществляется путем их смешивания с рабочими растворами средства в соответствии с режимами, приведенными в таблице 10. Пищевые отходы смешивают с рабочим раствором средства в соответствии с режимами таблицы 10.

3.18. Поверхности и объекты, загрязненные биологическими жидкостями и выделениями обрабатывают в 2 этапа.

На первом этапе проводится очистка поверхностей перед дезинфекцией – поверхность тщательно протирают ветошью, смоченной в растворе средства дляудаления загрязнений.

На втором этапе проводится дезинфекция – поверхность или объект тщательно протирают салфеткой или ветошью, смоченной рабочим раствором. Выбор режима зависит от профиля учреждения здравоохранения, определяющего вид подавляющей инфекции.

3.19. Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных больных проводят по режиму обработки при соответствующей инфекции, согласно таблицам 2-9.

При проведении *профилактической дезинфекции* санитарного транспорта при условии отсутствия видимых загрязнений, особенно биологического материала, и транспорта для перевозки пищевых продуктов обработку объектов проводят способом орошения или протирания в соответствии с режимами, указанными в таблице 2.

3.20. После дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов обработанные поверхности промывают водой и вытирают насухо.

3.21. Обработку поверхностей и объектов на общественном транспорте и метрополитене, кабин и отсеков воздушных судов гражданской авиации проводят по режимам обработки санитарного транспорта, указанным в таблице 2.

3.22. Режимы дезинфекции различных объектов в лечебно-профилактических учреждениях приведены в таблицах 2-6.

3.23. При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 14.

3.24. Режимы дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, поверхностей приборов и аппаратов, белья, посуды, предметов ухода за больными, игрушек, уборочного инвентаря, медицинских отходов и пр. при особо опасных инфекциях и спороцидному режиму, включая споры сибирской язвы, проводят по режимам согласно таблицам 8, 9.

3.25. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства при контаминации возбудителями легионеллеза представлены в таблице 11.

3.26. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства при анаэробных инфекциях представлены в таблице 12.

3.27. Обработка яиц, используемых для приготовления блюд, осуществляется в отведенном месте в специальных промаркированных емкостях в следующей последовательности:

3.27.1. Дезинфекция яиц без видимых загрязнений скорлупы:

Предварительно овоскопированые и переложенные в решетчатые ящики, пластмассовые прокладки или другую тару яйца обрабатывают в двухсекционной ванне в следующем порядке.

В первой секции проводится замачивание в 0,2% или 0,3% растворе средства в течение 10 мин. или 5 мин. соответственно при температуре раствора 18-30 °С, после чего яйца направляют во вторую секцию для ополаскивания. Во второй секции яйца ополаскивают проточной водой с температурой 18-30 °С с помощью щеток до полного смывания следов дезинфектанта (не менее 1 мин).

Раствор средства для дезинфекции скорлупы яиц можно использовать многократно в течение рабочего дня с контролем действующих веществ тест-полосками. При загрязнении раствора (помутнение, появление хлопьев, изменение цвета, снижение концентрации действующих веществ) его следует заменить.

3.27.2. Дезинфекция яиц с загрязненной скорлупой:

Для совмещения мойки и дезинфекции в одном этапе яйца с загрязненной скорлупой устанавливают в ящиках, пластмассовых прокладках или другой таре на решетки в ванну для замачивания в 0,2% или 0,3% растворе средства при температуре 18-30 °С на 10 мин. или 5 мин. соответственно. По истечении времени яйца очищают щетками в том же растворе, после чего направляют во вторую секцию для ополаскивания, где яйца ополаскивают проточной водой с температурой 18-30 °С до полного смывания следов дезинфектанта (не менее 1 мин).

При проведении совмещенной мойки и дезинфекции поверхности скорлупы яиц рабочий раствор используют однократно.

Обработанные яйца ставят на решетки стеллажи на 15-20 мин для стекания воды и подсушивания.

Чистое яйцо выкладывают в чистую промаркированную посуду.

Режимы обеззараживания куриных яиц рабочими растворами средства приведены в табл. 2.

Подробно технология и контроль санитарной обработки скорлупы яиц изложены в документах- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», утверждённых Минздравом РФ 08.11.2001; СанПиН 2.3.5.021-94 «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли, утверждённых Госкомсанэпиднадзором России 30.12.1994.

3.28. Для обеззараживания (дезинвазии) поверхностей и объектов в отношении цист, ооцист простейших, яиц, онкосфер и личинок гельминтов дезинфекция проводится по режимам таблицы 13.

3.29. Для использования в дезковриках, дезбарьерах и дезматах используют 0,5% раствор средства. Объем заливаемого раствора средства зависит от размера коврика и указан в инструкции по его эксплуатации. Смена рабочего раствора зависит от интенсивности его использования (в среднем – 1 раз в 3-е суток).

3.30. На предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития и т.д.), культурных, административных объектах, учреждениях социального обеспечения, предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, промышленных рынках, детских школьных и дошкольных и др. учреждениях, на предприятиях парфюмерно-косметической, фармацевтической и биотехнологической промышленности (по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты С и D) дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при бактериальных инфекциях (табл. 2).

В пенитенциарных учреждениях дезинфекцию проводят в соответствии с режимами таблицы 3.

3.31. Дезинфекцию поверхностей помещений, оборудования, инвентаря в парикмахерских, салонах красоты, косметических и массажных салонах, СПА-центрах проводят в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, регулирующими деятельность этих объектов (СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг").

3.32.1 Дезинфекцию поверхностей, оборудования на объектах сферы обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, косметические и массажные салоны и т.п.) проводят по режимам, рекомендованными для дезинфекции объектов при дерматофитиях (табл. 6).

3.33.2 Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос дезинфицируют методом погружения по режиму, применяемому при грибковых (дерматофитии) заболеваниях (табл.6).

3.33.3 Ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента должны подвергаться дезинфекции при полном погружении в дезинфицирующий раствор по режиму, применяемому при грибковых (дерматофитии) заболеваниях (табл.6).

3.33.4 Подушка, подкладываемая под ногу, при проведении педикюра должна иметь клеёнчатый чехол, который после каждого использования протирается губкой, салфеткой или ветошью, смоченной раствором средства по режиму, применяемому при грибковых (дерматофитии) заболеваниях (табл.6).

3.33.5 Дезинфекцию и мойку, совмещенную с дезинфекцией, соляриев проводят после каждого клиента раствором средства, нанесенным на губку, салфетку, ветошь или щетку.

3.33.6 Инвентарь, используемый для уборки всех помещений, педикюрного и маникюрного кабинета, дезинфицируют погружением в раствор средства, по окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.

3.33.7 Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек (маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, пилинг, скраб-пилинг косметические услуги) после каждого клиента необходимо сначала промыть в проточной воде, затем просушить и обработать дезинфицирующим раствором по режимам, применяемым при вирусных инфекциях (табл. 3). После окончания дезинфекции инструменты подвергают предстерилизационной очистке и стерилизации.

3.34. Отходы (изделия однократного применения – накидки, шапочки, инструменты и др.) полностью погружают в отдельную емкость с растворами средства. По окончании дезинфекционной выдержки отходы утилизируют.

3.35. В банях, саунах, бассейнах, аквапарках, прачечных дезинфекцию проводят в соответствии с режимами таблицы 6, при необходимости, по режимам, рекомендованным для обработки при плесневых поражениях (таблица 7)

3.36. Для дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов и т.п., применяются режимы, указанные в таблицах 2.

3.37. Профилактическую, текущую и вынужденную дезинфекцию, совмещенную с мойкой, поверхностей помещений, стеллажей, инвентаря, тары на плодоовощных базах, складах, овоще- и фруктохранилищах для предупреждения развития гнилостных бактерий проводят после механической очистки 0,25% раствором средства при экспозиции 60 минут, 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут, 2% раствором средства при экспозиции 5 минут. Норма расхода средства составляет 100-300 мл/м^2. После обработки проводят влажную уборку. Мелкий инвентарь отмывают от остатков средства проточной водой.

Поверхности, поражённые плесенью, сначала очищают от плесени, затем двукратно, с интервалом между обработками 15 мин. обрабатывают способом протирания или орошения 2%, 3% или 4% раствором средства при экспозиции 90 мин., 60 мин. или 30 мин. соответственно. Для предотвращения роста плесени повторную обработку проводят через 1 месяц.

3.38. Для обеззараживания подошв обуви и колёс тележек используют дезинфекционные коврики или маты, заполненные 0,5% раствором средства. Объем заливаемого раствора средства зависит от размера коврика и указан в инструкции по эксплуатации дезковрика. Коврик необходимо расположить при входе в помещение и заполнить раствором дезинфицирующего средства. С целью обеззараживания подошв обуви и колёс тележек необходимо несколько раз протереть подошву обуви о коврик, а тележкой сделать несколько поступательных движений по коврику. Смена рабочего раствора зависит от интенсивности использования коврика. По мере загрязнения коврики промывают водопроводной водой, высущивают и вновь заполняют раствором средства. В среднем смена раствора дезсредства происходит 1 раз в 3 суток.

3.39. Режимы профилактической дезинфекции различных объектов растворами средства на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития и т.д.), в кинотеатрах, административных объектах, офисах, на предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, промышленных рынках, общественных туалетах, детских школьных и дошкольных учреждениях, организациях образования, культуры, отдыха, учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях, на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов и др.; проведения генеральных уборок приведены в табл.15.

3.40. Режимы профилактической дезинфекции различных объектов в парикмахерских, банях, бассейнах, культурно-оздоровительных комплексах, спорткомплексах, массажных и косметических салонах, саунах, салонах красоты, санпропускниках, и др. растворами средства приведены в табл.16.

3.41. Обработку небольших по площади поверхностей возможно проводить с помощью пропитанных рабочим раствором салфеток, помещённых в диспенсерную систему.

3.41.1. Подготовка диспенсерной системы с салфетками к работе.

Для приготовления салфеток к использованию открывают крышку диспенсерной системы с салфетками и равномерно, в верхнюю часть рулона аккуратно заливают средство из расчета 2,5

мл средства на каждые 100 см^2 площади салфеток в рулоне для салфеток плотностью >30 г/м^2 и 2 мл средства на каждые 100 см^2 площади салфеток в рулоне для салфеток плотностью < 30 г/м^2 . Крышку банки плотно закрывают, и оставляют на 10-20 мин. при комнатной температуре, за это время все салфетки должны быть полностью пропитаны дезинфицирующим средством. Наклеить на ёмкость-диспенсер заполненный формуляр, на котором указать наименование средства, концентрацию рабочего раствора, размер салфеток, количество салфеток в упаковке, дату пропитки салфеток, срок годности. После пропитывания салфеток крышку диспенсера открыть, аккуратно продеть первую салфетку из середины рулона сквозь прорезь в крышке диспенсера и плотно закрыть крышку. После извлечения необходимого количества салфеток ёмкость-диспенсер следует сразу же закрыть крышкой во избежание высыхания салфеток.

Срок годности салфеток, пропитанных средством - 6 месяцев.

3.41.2. Дезинфекция небольших по площади поверхностей с помощью приготовленных влажных салфеток из диспенсерной системы проводится по режимам соответствующей инфекции методом протирания.

В зависимости от размера и конфигурации поверхностей для их обработки используют одну или, в случае необходимости, несколько салфеток.

3.42. Рабочие растворы средства можно применять для обработки любых объектов многократно в течение срока, не превышающего 14 дней (при условии хранения в герметично закрытой емкости), если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.

Таблица 2. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ДЕЗОН D102(гипохлор)» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях.

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззара-живания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткаяи мягкая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт, транспорт для перевозки пищевых продуктов	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Двукратное протирание или двукратное орошение
Посуда аптечная и лабораторная	1,0 2,0 3,0 4,0	60 30 15 5	Погружение
Посуда столовая без остатков пищи	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Погружение
Посуда с остатками пищи (в т.ч. однократного использования)	1,0 2,0 3,0 4,0	60 30 15 5	Погружение
Поверхности кухонного оборудования; клеёнки, скатерти	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Протирание

Кухонный инвентарь (кастрюли, ножи, мясорубки и др.)	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Протирание или погружение
Предметы для мытья посуды (ершики, щетки, ветошь)	1,0 2,0 3,0 4,0	60 30 15 5	Погружение
Белье незагрязнённое	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	1,0 2,0 3,0 4,0	90 60 30 10	Замачивание
Предметы ухода за больными	1,0 2,0 3,0 4,0	60 30 15 5	Протирание или погружение
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены	1,0 2,0 3,0 4,0	60 30 15 5	Протирание, орошение или погружение
Уборочный инвентарь, материал (ерши, щетки, ветошь), МОПы	1,0 2,0 3,0 4,0	90 60 30 10	Погружение, замачивание
Приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования и пр., датчики к аппаратам УЗИ	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Протирание, погружение
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Протирание, орошение, погружение
Поверхности и оборудование биотуалетов	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Двукратное протирание или двукратное орошение
Мусороуборочное оборудование, мусоровозы, мусорные баки и мусоросборники, мусоропроводы	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Орошение, протирание
Скорлупа куриных яиц	0,2 0,3	10 5	Погружение, орошение

Таблица 3 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ДЕЗОН D102 (гипохлор)» при вирусных инфекциях.

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, % (по препарату)	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, в т.ч. из дерева), предметы обстановки, приборы, оборудование; санитарный транспорт и транспорт для перевозки пищевых продуктов	0,25 0,5 1,0	60 30 15	Протирание или орошение
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственной и натуральной кожи, мягкая мебель	0,25 0,5 1,0	60 30 15	Протирание, обработка с помощью щетки
Санитарно-техническое оборудование	0,25 0,5 1,0	60 30 15	Протирание или орошение
Поверхности и оборудование биотуалетов	0,25 0,5 1,0	60 30 15	Протирание или орошение
Посуда без остатков пищи в т. ч. одноразовая	0,25 0,5 1,0	60 30 15	Погружение
Посуда с остатками пищи в т.ч. одноразовая	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Погружение
Посуда лабораторная, аптечная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги (в том числе однократного использования)	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Погружение
Предметы для мытья посуды (ершики, щетки, ветошь)	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Погружение
Поверхности кухонного оборудования; клеёнки, скатерти	0,25 0,5 1,0	60 30 15	Протирание
Кухонный инвентарь (кастрюли, доски разделочные, ножи, мясорубки и др.)	0,25 0,5 1,0	60 30 15	Протирание или погружение
Бельё, не загрязнённое выделениями	0,25 0,5 1,0	60 30 15	Замачивание
Бельё, загрязнённое выделениями	2,0 3,0 4,0	60 30 15	Замачивание
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены (из пластмассы, резины, металла)	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Протирание, орошение или погружение
Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Протирание или погружение

Уборочный инвентарь, материал (ерши, щетки, ветошь), МОПы	2,0 3,0	60 30	Замачивание
Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования и пр., датчики к аппаратам УЗИ	0,25 0,5 1,0	60 30 15	Протирание или погружение
Медицинские изделия: -беззамковые; -замковые	0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0	60 30 15 60 30 15	Погружение
Инструменты парикмахерских, салонов красоты, маникюрных и педикюрных кабинетов и пр.: -беззамковые; -замковые	0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0	60 30 15 60 30 15	Погружение
Мусороуборочное оборудование, мусоропроводы, мусоросборники, поверхности и оборудование биотуалетов	0,25 0,5 1,0	60 30 15	Протирание или орошение
Кровь	5,0	60	Смешивание:1:2 (проба/средство)
Выделения больного (моча, мокрота, смывные и околоплодные воды, рвотные массы)	2,0	30	Смешивание:1:1 (проба/средство)
Фекалии	2,0	30	Смешивание: 1:2 (проба/средство)
Медицинские отходы (использованный перевязочный материал, салфетки, бинты, ватно-марлевые тампоны, одноразовое нательное и постельное белье, одежда персонала, маски, медицинские изделия однократного назначения	4,0	60	Погружение, замачивание
Посуда из-под выделений больного	1,0	60	Погружение
Контейнеры для сбора мед. отходов	0,5 1,0	60 30	Протирание или орошение

Таблица 4. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ДЕЗОН D102 (гипохлор)» при бактериальных инфекциях, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на *Mycobacterium terrae*)

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззара-живания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткаяи мягкая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт	4,0 6,0 8,0	60 30 15	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	4,0 6,0 8,0	60 30 15	Двукратное протирание или двукратное орошение
Посуда аптечная и лабораторная	6,0 8,0 10,0	60 30 15	Погружение
Посуда столовая без остатков пищи	4,0 6,0 8,0	60 30 15	Погружение
Посуда с остатками пищи (в т.ч. однократного использования), кухонный инвентарь (кастрюли, ножи, мясорубки и др.)	6,0 8,0 10,0	60 30 15	Погружение
Предметы для мытья посуды (ершики, щетки, ветошь)	6,0 8,0 10,0	60 30 15	Погружение
Белье незагрязнённое	4,0 6,0 8,0	60 30 15	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	6,0 8,0 10,0	120 60 30	Замачивание
Предметы ухода за больными	6,0 8,0 10,0	60 30 15	Протирание или погружение
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены	6,0 8,0 10,0	60 30 15	Протирание или погружение
Плевательницы с мокротой	10,0	120	Погружение в емкость и заливание средством
Приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования и пр., датчики к аппаратам УЗИ	4,0 6,0 8,0	60 30 15	Протирание, погружение
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха	4,0 6,0 8,0	60 30 15	Протирание, орошение, погружение
Уборочный инвентарь, материал (ерши, щетки, ветошь), МОПы	6,0 8,0 10,0	120 60 30	Погружение, замачивание

Таблица 5. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ДЕЗОН D102 (гипохлор)» при кандидозах.

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззара-живания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткаяи мягкая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Двукратное протирание или двукратное орошение
Посуда аптечная и лабораторная	2,0 3,0 4,0	90 60 30	Погружение
Посуда столовая без остатков пищи	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Погружение
Посуда с остатками пищи (в т.ч. однократного использования), кухонный инвентарь (кастрюли, ножи, мясорубки и др.)	2,0 3,0 4,0	90 60 30	Погружение
Предметы для мытья посуды (ершики, щетки, ветошь)	2,0 3,0 4,0	90 60 30	Погружение
Белье незагрязнённое	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	2,0 3,0 4,0	120 90 60	Замачивание
Предметы ухода за больными	2,0 3,0 4,0	90 60 30	Протирание или погружение
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены	2,0 3,0 4,0	90 60 30	Протирание или погружение
Приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры,анестезиологического оборудования и пр., датчики к аппаратам УЗИ	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Протирание, погружение
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Протирание, орошение, погружение
Обувь из кожи, ткани, дерматина, пластика и резины и других синтетических материалов	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Протирание, погружение
Уборочный инвентарь, материал (ерши, щетки, ветошь), МОПы	2,0 3,0 4,0	120 90 60	Погружение, замачивание

Таблица 6. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ДЕЗОН D102 (гипохлор)» при дерматофитиях.

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззара-живания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Двукратное протирание или двукратное орошение
Посуда аптечная и лабораторная	3,0 4,0 5,0	90 60 30	Погружение
Посуда без остатков пищи	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Погружение
Посуда с остатками пищи (в т.ч. однократного использования)	3,0 4,0 5,0	90 60 30	Погружение
Предметы для мытья посуды (ершики, щетки, ветошь)	3,0 4,0 5,0	90 60 30	Погружение
Резиновые коврики и полипропиленовые, деревянные решётки	0,5 1,0 2,0 3,0	90 60 30 15	Погружение или протирание
Белье незагрязнённое	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	3,0 4,0 5,0	120 90 60	Замачивание
Предметы ухода за больными	3,0 4,0 5,0	90 60 30	Протирание или погружение
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены	3,0 4,0 5,0	90 60 30	Протирание или погружение
Обувь из кожи, ткани, дерматина, пластика и резины и других синтетических материалов	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Погружение или двукратное протирание с интервалом 15 мин
Уборочный инвентарь, материал (ерши, щетки, ветошь), МОПы	3,0 4,0 5,0	120 90 60	Погружение, замачивание
Приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры,анестезиологического оборудования и пр., датчики к аппаратам УЗИ	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Протирание, погружение

Инструменты парикмахерских, салонов красоты, маникюрных и педикюрных кабинетов и пр. (расчески, щетки, ножницы для стрижки волос, ванны для ног и ванночки для рук)	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Погружение
Отходы (изделия однократного использования – инструменты, накидки, шапочки, белье, ватные тампоны, салфетки и др.)	3,0 4,0 5,0	120 90 60	Погружение

Таблица 7. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ДЕЗОН D102(гипохлор)» при поражениях плесневыми грибами.

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззара-живания мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки, поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	2,0 3,0 4,0	90 60 30	Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин
Бельё, не загрязненное органическими субстратами	2,0 3,0 4,0	90 60 30	Замачивание
Бельё, загрязненное органическими субстратами	3,0 4,0 5,0	120 90 60	Замачивание
Посуда с остатками пищи (в т.ч. однократного использования)	3,0 4,0 5,0	90 60 30	Погружение
Посуда аптечная и лабораторная	3,0 4,0 5,0	90 60 30	Погружение
Уборочный инвентарь, материал (ерши, щетки, ветошь), МОПы	3,0 4,0 5,0	120 90 60	Погружение
Санитарно-техническое оборудование	2,0 3,0 4,0	90 60 30	Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин
Резиновые и полипропиленовые коврики	2,0 3,0 4,0	90 60 30	Погружение или протирание
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха	2,0 3,0 4,0	90 60 30	Протирание, орошение, погружение

Таблица 8. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ДЕЗОН D102(гипохлор)» приособо опасных инфекциях бактериальной этиологии (чумы, холера, туляремия).

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззара-живания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Двукратное протирание или двукратное орошение
Посуда без остатков пищи	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Погружение
Посуда с остатками пищи (в т.ч. однократного использования)	1,0 2,0 3,0	90 60 30	Погружение
Посуда аптечная, лабораторная; предметы для мытья посуды	1,0 2,0 3,0	90 60 30	Погружение
Белье, в.ч. загрязненное выделениями	1,0 2,0 3,0	120 90 60	Замачивание
Предметы ухода за больными	1,0 2,0 3,0	90 60 30	Протирание или погружение
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены	1,0 2,0 3,0	90 60 30	Протирание или погружение
Уборочный инвентарь, материал (ерши, щетки, ветошь), МОПы	1,0 2,0 3,0	120 90 60	Погружение, замачивание
Приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры,анестезиологического оборудования и пр., датчики к аппаратам УЗИ	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Протирание, погружение

Таблица 9. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ДЕЗОН D102(гипохлор)» по спороцидному режиму, включая споры сибирской язвы.

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззара-живания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт	4,0 8,0 10,0	120 60 30	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	4,0 8,0 10,0	120 60 30	Двукратное протирание или двукратное орошение

Посуда без остатков пищи	4,0 8,0 10,0	120 60 30	Погружение
Посуда с остатками пищи (в т.ч. однократного использования)	8,0 10,0 15,0	120 60 30	Погружение
Посуда аптечная, лабораторная; предметы для мытья посуды	8,0 10,0 15,0	120 60 30	Погружение
Белье, в.ч. загрязненное выделениями	8,0 10,0 15,0	120 60 30	Замачивание
Предметы ухода за больными	8,0 10,0 15,0	120 60 30	Протирание или погружение
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены	8,0 10,0 15,0	120 60 30	Протирание или погружение
Уборочный инвентарь, материал (ерши, щетки, ветошь), МОПы	8,0 10,0 15,0	120 60 30	Погружение, замачивание
Приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования и пр., датчики к аппаратам УЗИ	4,0 8,0 10,0	120 60 30	Протирание, погружение

Таблица 10. Режимы дезинфекции различных медицинских отходов, емкостей из-под выделений и биологических выделений растворами средства «ДЕЗОН D102(гипохлор)».

Объекты обеззараживания	Вид инфекции	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Медицинские отходы класса А, контейнеры для сбора таких отходов (неопасные отходы. отходы, не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы.	при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях	0,25 0,5 1,0	60 30 15	Погружение, замачивание
Пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных	при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях	1,0 2,0 3,0 4,0	90 60 30 10	Смешивание рабочего раствора средства с отходами в соотношении 1:1(1частьраство ра к 1частям отходов)
Медицинские отходы класса Б, контейнеры для сбора таких отходов (опасные отходы. Инфицированные отходы. Материалы и инструменты, загрязненные	при бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных инфекциях	4,0	60	Погружение, замачивание

выделениями, в т.ч. кровью. Патологоанатомические и органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.). Все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые)).	При бактериальных (включая туберкулез), грибковых инфекциях	8,0 10,0	120 90	
	При грибковых инфекциях	4,0 5,0 6,0	120 90 60	
Медицинские отходы класса В, контейнеры для сбора таких отходов (чрезвычайно опасные отходы. Материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями. Отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-2 группы патогенности. Отходы фтизиатрических, микологических больниц. Отходы от пациентов с анаэробной инфекцией)	При бактериальных (включая туберкулез), грибковых инфекциях	8,0 10,0	120 90	Погружение, замачивание
	при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия)	2,0 3,0 4,0	120 90 60	
	при сибирской язве	10,0 15,0	120 60	
	при анаэробных инфекциях	6,0 8,0	120 90	
Биологический материал (кровь, кровь со сгустками, кровь донорская, препараты крови с истекшим сроком годности, компоненты крови, плазма и пр., мокрота, рвотные массы, моча, фекалии, слизи, сыворотка, эритроцитарная масса, околоплодные воды и др.), смывные жидкости (эндоскопические, после ополаскивания зева), вакцины с просроченным сроком годности (в том числе БЦЖ) перед их утилизацией	При бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях	2,0 3,0 4,0	90 60 30	Смешивание рабочего раствора средства с отходами в соотношении 2:1 (2 части раствора к 1 частям отходов)
	При вирусных инфекциях	5,0	60	
	При грибковых инфекциях	4,0 5,0 6,0	120 90 60	
	При бактериальных (включая туберкулез), грибковых инфекциях	8,0	90	
	при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия)	2,0 3,0 4,0	120 90 60	
	при сибирской язве	10,0 15,0	120 60	
дезинфекция пиявок после проведения гирудотерапии	При вирусных инфекциях	5,0	60	Погружение

	При бактериальных (включая туберкулез), грибковых инфекциях	8,0	90	
Посуда лабораторная, посуда из-под выделений, емкости, материалы, загрязненные выделениями больного	При бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных инфекциях	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Погружение, протирание, замачивание
	При грибковых инфекциях	3,0 4,0 5,0	90 60 30	
	При бактериальных (включая туберкулез), грибковых инфекциях	6,0 8,0 10,0	60 30 15	
	при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия	1,0 2,0 3,0	90 60 30	
	при сибирской язве	8,0 10,0 15,0	120 60 30	
	при анаэробных инфекциях	6,0 8,0	120 90	

Таблица 11. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ДЕЗОН D102(гипохлор)» при контаминации возбудителями легионеллеза.

Объект обеззараживания	Концентрация раствора (по препарату), %	Время обеззара-живания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Протирание или орошение
Посуда с остатками пищи, посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях	0,5 1,0 2,0 3,0	90 60 30 15	Погружение
Белье, не загрязненное выделениями	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	0,5 1,0 2,0	90 60 30	Замачивание
Предметы ухода, игрушки	0,5 1,0 2,0 3,0	90 60 30 15	Погружение или орошение

Санитарно-техническое оборудование, в т. ч. душевые установки, ванны для бальнеопроцедур	0,5 1,0 2,0	60 30 15	Двукратное протирание или двукратное орошение
Уборочный инвентарь	0,5 1,0 2,0 3,0	90 60 30 15	Замачивание

Таблица 12. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ДЕЗОН D102(гипохлор)» при анаэробных инфекциях.

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обработки, мин.	Способ обработки
Поверхности в помещениях, жесткая и мягкая мебель, наружныеповерхности приборов, аппаратов ит.д., санитарный транспорт, транспорт для перевозки пищевых продуктов	3,0 4,0 6,0	120 90 60	Протирание или орошение
Санитарно-техническое оборудование, инвентарь	3,0 4,0 6,0	120 90 60	Двукратное протирание или двукратное орошение
Посуда без остатков пищи	3,0 4,0 6,0	120 90 60	Замачивание, погружение
Посуда с остатками пищи (в т.ч. однократного использования)	4,0 6,0 8,0	120 90 60	Замачивание, погружение
Белье, в т.ч. загрязненное	4,0 6,0 8,0	120 90 60	Замачивание, погружение
Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, уборочный инвентарь, МОПы	4,0 6,0 8,0	120 90 60	Протирание, погружение
Приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудованияи пр., датчики к аппаратам УЗИ	3,0 4,0 6,0	120 90 60	Протирание, орошение, погружение

Таблица 13. Режимы деконтаминации (дезинвазии) различных объектов растворами средства «ДЕЗОН D102(гипохлор)» при контаминации цистами и ооцистами, яйцами, онкосферами и личинками глистов.

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по активному хлору), %	Время обработки, мин.	Способ обработки
Поверхности в помещениях, жесткая и мягкая мебель, наружныеповерхности приборов, аппаратов ит.д., санитарный транспорт, транспорт для перевозки пищевых продуктов	4,0 6,0	90 60	Протирание или орошение

Санитарно-техническое оборудование, инвентарь	6,0 8,0	90 60	Замачивание, погружение, протирание или орошение
Посуда лабораторная, аптечная	6,0 8,0	90 60	Замачивание, погружение
Посуда столовая, предметы для мытья посуды	6,0 8,0	90 60	Замачивание, погружение
Белье, в т.ч. загрязненное	6,0 8,0	120 90	Замачивание
Перчатки резиновые	4,0 6,0	90 60	Погружение
Предметы ухода за больными	6,0 8,0	90 60	Протирание, погружение
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены	6,0 8,0	90 60	Протирание, погружение
Уборочный инвентарь, материал (ерши, щетки, ветошь), МОПы	6,0 8,0	120 90	Замачивание, погружение
Почва	8,0 10,0	60 30	Заливание почвы до полного смачивания

Таблица 14. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ДЕЗОН D102(гипохлор)» при проведении генеральных уборок в ЛПУ и др. учреждениях.

Профиль учреждения	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззара-живания, мин	Способ обеззараживания
Палатные отделения, врачебные кабинеты, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ или ЛПО любого профиля (кроме инфекционного)	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Протирание или орошение
Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения	4,0 6,0 8,0	60 30 15	Протирание или орошение
Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров	0,25 0,5 1,0	60 30 15	Протирание или орошение
Инфекционные лечебно-профилактические учреждения*	по режиму соответствующей инфекции		Протирание или орошение
Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Протирание или орошение
Детские учреждения, учреждения социального обеспечения, коммунальные объекты	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Протирание

Таблица 15 Режимы профилактической дезинфекции различных объектов растворами средства «ДЕЗОН D102(гипохлор)» на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития и т.д.), в кинотеатрах, административных объектах, офисах, на предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, промышленных рынках, общественных туалетах, детских школьных и дошкольных учреждениях, организациях образования, культуры, отдыха, учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях, на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов и др.; проведения генеральных уборок.

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззара-живания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, транспорт для перевозки пищевых продуктов	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Протирание или орошение
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственной и натуральной кожи, мягкая мебель	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Протирание, обработка с помощью щетки
Санитарно-техническое оборудование	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин
Поверхности и оборудование биотуалетов	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Двукратное протирание с интервалом 15 мин
Посуда без остатков пищи	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Погружение
Посуда с остатками пищи (в т.ч. однократного использования)	1,0 2,0 3,0 4,0	60 30 15 5	Погружение
Предметы для мытья посуды (ершики, щетки, ветошь)	1,0 2,0 3,0 4,0	60 30 15 5	Погружение
Поверхности кухонного оборудования; клеёнки, скатерти	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Протирание
Кухонный инвентарь (кастрюли, доски разделочные, ножи, мясорубки и др.)	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Протирание или погружение
Предметы ухода, средства личной гигиены, игрушки, спортивный инвентарь, (из пластмассы, резины, металла)	1,0 2,0 3,0 4,0	60 30 15 5	Протирание, орошение или погружение

Белье незагрязненное выделениями	0,25 0,5 1,0	60 30 15	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	1,0 2,0 3,0 4,0	90 60 30 10	Замачивание
Уборочный инвентарь, материал (ерши, щетки, ветошь), МОПы	1,0 2,0 3,0 4,0	90 60 30 10	Погружение, замачивание
Мусоросборники, мусоропроводы, мусороуборочное оборудование	0,25 0,5 1,0 2,0	60 30 15 5	Протирание или орошение
Скорлупа куриных яиц	0,2 0,3	10 5	Погружение, орошение

Таблица 16. Режимы профилактической дезинфекции различных объектов (парикмахерские, бани, бассейны, культурно-оздоровительные комплексы, спорткомплексы, массажные и косметические салоны, сауны, салоны красоты, санпропускники, и др.) растворами средства «ДЕЗОН D102(гипохлор)»

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Протирание или орошение
Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, покрытия из искусственной и натуральной кожи, мягкая мебель	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Протирание, обработка с помощью щетки
Санитарно-техническое оборудование	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин
Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Погружение
Посуда с остатками пищи, в т.ч. одноразовая	3,0 4,0 5,0	90 60 30	Погружение
Резиновые коврики и полипропиленовые, деревянные решётки	0,5 1,0 2,0 3,0	90 60 30 15	Погружение или протирание
Белье незагрязненное	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Замачивание

Белье, загрязненное выделениями	3,0 4,0 5,0	120 90 60	Замачивание
Предметы ухода, средства личной гигиены, игрушки, спортивный инвентарь, (из пластмассы, резины, металла)	3,0 4,0 5,0	90 60 30	Протирание или погружение
Обувь из кожи, ткани, дерматина, пластика и резины и других синтетических материалов	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Погружение или двукратное протирание с интервалом 15 мин
Уборочный инвентарь, материал (ерши, щетки, ветошь), МОПы	3,0 4,0 5,0	120 90 60	Погружение, замачивание
Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос, ванны для ног и ванночки для рук	1,0 2,0 3,0	60 30 15	Погружение
Отходы (изделия однократного использования – инструменты, накидки, шапочки, белье, ватные тампоны, салфетки и др.)	3,0 4,0 5,0	120 90 60	Погружение
Инструменты парикмахерских, салонов красоты, маникюрных и педикюрных кабинетов и пр.: -беззамковые; -замковые	 0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0	 60 30 15 60 30 15	 Погружение

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При приготовлении рабочих растворов необходимо избегать попадания средства на кожу и в глаза.

4.2. Работу со средством проводить в резиновых перчатках.

4.3. Дезинфекцию поверхностей способом протирания возможно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания.

4.4. Обработку поверхностей растворами средства способом орошения проводить в отсутствии пациентов и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз - герметичными очками.

4.5. Емкости с раствором средства должны быть закрыты.

4.6. При проведении работ со средством следует строго соблюдать правила личной гигиены. После работы вымыть лицо и руки с мылом.

4.7. Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных веществ.

4.8. При случайной утечке или разливе средства его уборку необходимо проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки).

Пролившееся средство необходимо адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

4.9. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию!

5 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1 При попадании в глаза средство вызывает ожоги слизистой оболочки и повреждение роговицы. Необходимо немедленно! промыть их проточной водой в течение 10-15 минут (веки удерживать раскрытыми), затем закапать сульфацил натрия в виде 30% раствора. Обратиться к врачу-окулисту.

5.2 При попадании средства на кожу немедленно вымыть ее большим количеством воды. Смазать смягчающим кремом. При необходимости обратиться к врачу.

5.3 При появлении признаков раздражения органов дыхания – вывести пострадавшего на свежий воздух, прополоскать рот водой; в последующем назначить полоскание или тепло-влажные ингаляции 2% раствором гидрокарбоната натрия; при нарушении носового дыхания рекомендуется использовать 2% раствор эфедрина; при поражении гортани – режим молчания и питье теплого молока с содой, боржоми. При необходимости обратиться к врачу.

5.4 При случайном попадании средства в желудок через рот появляется боль, ожоги слизистой оболочки рта. Немедленно промыть рот водой, затем необходимо выпить несколько стаканов воды с 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

6.1 Средство выпускает в закрытых полимерных флаконах вместимостью от 0,05 дм^3 до 1,5 дм^3, канистрах вместимостью от 1,5 дм^3 до 50 дм^3, полиэтиленовых бочках вместимостью до 250 дм^3 , ёмкостях пластиковых 1 м^3 с дегазирующими крышками.

6.2 Средство транспортировать всеми доступными видами транспорта, в упаковке производителя, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, гарантирующими сохранность продукции и тары. В соответствии с ГОСТ 19433-81 средство не является опасным грузом.

При низких температурах средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства.

6.3 Хранить средство при температуре от +1°С до +25 °в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла, избегая попадания прямого солнечного света, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, горючих материалов и кислот, в местах, недоступных детям.

6.4 Срок годности средства – 1,5 года в невскрытой упаковке изготовителя.

6.5 В аварийных ситуациях при случайной утечке или разливе средства его уборку следует проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты - кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки).

Пролившееся средство следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, опилки, ветошь, силикагель), собрать и отправить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. При небольшом проливе смыть средство смыть в канализацию водой.

6.6 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

7.1 По физико-химическим показателям средство «ДЕЗОН D102 (гипохлор)» должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 17.

Таблица 17. Показатели качества дезинфицирующего средства с моющим действием «ДЕЗОН D102 (гипохлор)»

№ п/п	Наименование показателей	Нормы	Методы контроля по ТУ 20.20.14 - 028-17643541-2022
1	Внешний вид	прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость	п.5.1
2	Запах	Слабый специфический	п.5.1

3	Показатель активности водородных ионов (pH) 1% водного раствора	12,0±1,0	п.5.2
4	Плотность средства при 20^0С, г/см^3	1,2±0,1	п.5.3
5	Массовая доля активного хлора, %	6,0± 1,5	п.5.4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Дезинфекция в общеобразовательных учреждениях (включая детские дошкольные и школьные образовательные учреждения)

1. Дезинфекцию поверхностей помещений, оборудования, посуды, инвентаря и прочих объектов в образовательных учреждениях (включая детские дошкольные и школьные образовательные учреждения) проводят в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, регулирующими деятельность этих объектов (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений").

2. Места общего пользования туалеты, буфет, столовая и медицинский кабинет образовательных учреждений (включая детские дошкольные образовательные учреждения) всегда убирают с использованием дезинфицирующих средств.

3. Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию независимо от эпидситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей двукратно обрабатывают 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут, норма расхода средства 100-200 мл/м^2.

4. Раковины, унитазы, писсуары обрабатывают с помощью квачей, щеток или ветоши 0,25%, 0,5%, 1%, 2% раствором средства «ДЕЗОН D102». Норма расхода средства составляет 150-300 мл/м^2. Время дезинфекционной выдержки 60 мин., 30 мин., 15 мин., 5 мин. соответственно. По окончании дезинфекции сантехнику промывают водой.

5. Уборку столовой проводят после каждого посещения ее детьми (завтрак, обед, полдник). После каждого приема пищи столы моют горячими растворами моющих средств.

6. Во время карантина мытье столовой посуды, стеклянной посуды и столовых приборов ручным способом осуществляется по режиму соответствующей инфекции (таблицы 2-4) следующим образом: после механического удаления остатков пищи, посуду погружают в 1-ое гнездо ванны с рабочим раствором «ДЕЗОН D102», по окончании дезинфекционной выдержки посуду перемещают во 2-ое гнездо ванны и промывают с помощью щетки или ерша проточной питьевой водой не менее 3 минут, затем посуду просушивают на специальных полках или решетках.

7. Мочалки, губки для мытья посуды и ветошь для протирки столов по окончании уборки замачивают в 1% рабочем растворе средства «ДЕЗОН D102» на 60 минут, 2% растворе на 30 минут, 3% растворе на 15 минут, 4% растворе на 5 минут затем прополаскивают и сушат. Во время карантина мочалки, губки для мытья посуды и ветошь для протирки столов дезинфицируют по режиму соответствующей инфекции, в соответствии с таблицами 2-5.

8. Остатки пищи обеззараживают путем смешивания с рабочим раствором дезинфицирующего средства «ДЕЗОН D102» концентрацией 1%,2%,3%,4% в соотношении 1:1(1 часть раствора к 1 частям отходов). Дезинфицирующий раствор заливается непосредственно в емкость. Далее полученная смесь выдерживается 90 мин, 60 мин, 30 мин. или 10 мин. соответственно и утилизируется. Во время дезинфекции в емкости, последняя должна быть закрыта крышкой.

9. Обеззараживание помещения, предметов обстановки, поверхности оборудования и предметов ухода за больными в медицинском кабинете проводятся в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при бактериальных инфекциях в таблице 2.

10. В период карантина ежедневному обеззараживанию подлежат все помещения, где находились дети из класса (группы) с установленным карантином, дезинфекция проводится по режиму соответствующей инфекции (табл. 2-5). При проведении дезинфекции особое внимание уделяют обработке объектов, играющих решающую роль в передаче данной инфекции. При капельных инфекциях – частое проветривание классов (на каждой перемене), тщательное удаление пыли в помещениях, обеззараживание посуды; при кишечных инфекциях – обеззараживание посуды, игрушек, поверхностей обеденных столов, туалетов.

11. В помещениях, где оборудованы уголки живой природы, проводят ежедневную влажную уборку, чистку клеток, кормушек, замену подстилок, мытье поилок и смену в них воды. Один раз в две недели клетки, кормушки, поилки необходимо дезинфицировать 0,5% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 1% раствором средства при экспозиции 30 минут, 2,0% раствором средства при

экспозиции 15 минут методом протирания, норма расхода средства 100-200 мл/м^2 с последующей промывкой проточной водой и высушиванием. После дезинфекции в клетку кладут чистую подстилку и корм.

12. Один раз в месяц проводят генеральную уборку всех помещений в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при бактериальных инфекциях (табл. 13).

13. Дезинфекцию мусоросборников после опорожнения, помойных ям, мусорных ящиков, мусорных контейнеров проводят методом орошения 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут. Норма расхода средства составляет 150-300 мл/м^2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Дезинфекция на предприятиях общественного питания

1. Дезинфекция на предприятиях общественного питания (столовых, ресторанах, кафе, барах, буфетах, раздаточных пунктах) проводится в соответствии с санитарными правилами и нормативами, регулирующими их деятельность (СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»)

2. Дезинфицирующее средство с моющим действием «ДЕЗОН D102» предназначено для:

- дезинфекции, совмещенной с мойкой (после предварительной механической очистки от пищевых остатков) поверхностей помещений, мебели, оборудования, инвентаря, тары на предприятиях общественного питания;
- дезинфекции после предварительной мойки обрабатываемых объектов моющими средствами, разрешенными для использования на предприятиях пищевой промышленности.

3. Дезинфекция поверхностей помещений, мебели, оборудования, инвентаря, тары на предприятиях общественного питания проводят методом орошения, протирания или погружения (мелкий инвентарь).

4. Дезинфекцию после предварительной мойки поверхностей помещений (пол, стены, двери и т.д.), жесткой и полужесткой мебели (столы, стулья, кресла, диваны, стеллажи, витрины и т.д.) в залах приема пищи, буфетах, раздаточных пунктах, складских и бытовых помещениях (сервизные, бельевые, гардеробные), кладовых овощей, солений, полуфабрикатов проводят 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут, норма расхода средства 100-200 мл/м^2.

Дезинфекцию, совмещенную с мойкой, вышеперечисленных объектов проводят аналогично. Норма расхода средства – 100-300 мл/м^2.

После обработки проводят влажную уборку.

5. Дезинфекцию после предварительной мойки поверхностей производственных помещений (мясного, рыбного, птицегольевого, овощного, доготовочного, заготовочного, горячего, холодного, моечного и др. цехов), технологического оборудования (производственных столов, фаршевых машин, тележек, транспортеров, овощемоек, овощечисток, льдогенераторов и др.) холодильного оборудования, дефростеров, производственных и моечных ванн, инвентаря (разделочных досок, ножей, пил, подносов, лотков и др.) проводят 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут, норма расхода средства 100-200 мл/м^2.

Дезинфекцию, совмещенную с мойкой, вышеперечисленных объектов проводят аналогично. Норма расхода средства составляет 150-300 мл/м^2.

После обработки проводят влажную уборку

6. Дезинфекцию производственных помещений кондитерских цехов (помещения для зачистки масла, помещения для обработки яиц с отделением для приготовления яичной массы с холодильным оборудованием для ее хранения, помещения для приготовления и разделки теста, отделения приготовления отделочных полуфабрикатов, отделение приготовления крема с холодильным оборудованием, помещения отделки кондитерских изделий с холодильной камерой, экспедицию кондитерских изделий с холодильной камерой, моечную внутрицеховой тары, моечную и стерилизационную кондитерских мешков, наконечников, мелкого инвентаря, технологического оборудования, находящегося в этих помещениях, крупного и мелкого инвентаря) проводят 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут, норма расхода средства 100-200 мл/м^2.

Дезинфекцию, совмещенную с мойкой, вышеперечисленных объектов проводят аналогично. Норма расхода средства составляет 100-300 мл/м^2.

После обработки проводят влажную уборку.

7. Обработку скорлупы яиц (сырых и вареных) осуществляют в отведенном месте в специальных промаркированных емкостях в соответствии «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и пищевого сырья «СП 2.3.6.1079-01», утверждённых Минздравом РФ 08.11.2001; СанПиН 2.3.5.021-94 «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли, утверждённых Госкомсанэпиднадзором России 30.12.1994.

7.1. Дезинфекция яиц без видимых загрязнений скорлупы:

Обработка яиц, используемых для приготовления блюд, осуществляется в отведенном месте в специальных промаркированных емкостях в следующей последовательности: отсортированные яйца (проверенные на отсутствие повреждений скорлупы), без видимых загрязнений погружаются в 0,2% или 0,3% растворы средства на 10 минут или 5 минут соответственно, после чего их ополаскивают холодной проточной водой. Обработка проводится при температуре 18-30^{0}С. Чистое яйцо выкладывают в чистую промаркированную посуду. При проведении совмещенной мойки и дезинфекции поверхности скорлупы яиц рабочий раствор используют однократно.

7.2. Дезинфекция яиц с загрязненной скорлупой:

Для совмещения мойки и дезинфекции в одном этапе яйца с загрязненной скорлупой устанавливают в ящиках, пластмассовых прокладках или другой таре на решетки в ванну для замачивания в 0,2% или 0,3% растворе средства при температуре 18-30 °С на 10 мин или 5 мин. соответственно. По истечении времени дезинфекции яйца очищают щетками в том же растворе, после чего направляют во вторую секцию для ополаскивания, где яйца ополаскивают проточной водой с температурой 18-30 °С до полного смывания следов дезинфектанта (не менее 1 мин).

При проведении совмещенной мойки и дезинфекции поверхности скорлупы яиц рабочий раствор используют однократно.

7.3. Обработанные яйца ставят на решетки стеллажи на 15-20 мин для стекания воды и подсушивания

7.4. Чистое яйцо выкладывают в чистую промаркированную посуду.

Режимы обеззараживания куриных яиц рабочими растворами средства приведены в табл. 2.

7.5. Полноту смываемости остатков раствора средства «ДЕЗОН D102» определяют по наличию (отсутствию) концентрации свободного хлора. в смывных водах и на поверхности оборудования. Контроль можно проводить с помощью индикаторных полосок “НС-Хлор”, погружая индикатор в смывную воду и прикладывая к поверхности обрабатываемого объекта.

8. Генеральную санитарную обработку проводят согласно внутреннему распорядку предприятия, но не реже одного раза в месяц. Дезинфекцию в залах приема пищи, буфетах, раздаточных пунктах, складских и бытовых помещениях (сервизные, бельевые, гардеробные), кладовых овощей, солений, полуфабрикатов проводят 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут.

9. Туалеты по мере необходимости и после окончания работы предприятия тщательно очищают, промывают и дезинфицируют путем орошения 0,25%, 0,5%, 1%, 2% раствором средства. Норма расхода средства составляет 150-300 мл/м^2. Время дезинфекционной выдржки 60 мин., 30 мин., 15 мин., 5 мин. соответственно. При каждой уборке туалетов протирают отдельно выделенной салфеткой, смоченной в 0,25%, 0,5%, 1%, 2% растворах средства, вентили водопроводных кранов, а также ручки и затворы дверей, спусковые ручки и другие поверхности, которых касаются руки человека при посещении туалета.

10. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки, ветошь) замачивают в 1% рабочем растворе средства «ДЕЗОН D102» на 90 минут 2% рабочем растворе на 60 минут, 3% растворе на 30 минут, 4% растворе на 10 минут. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Дезинфекция на предприятиях продовольственной торговли

1. Дезинфекция на предприятиях продовольственной торговли, включая крупные супермаркеты, рынки, плодоовощные базы, склады, овоще- и фруктохранилища, а также стационарные (палатки, киоски, автофургоны, павильоны) и передвижные (тележки, корзины, лотки, автолавки, автоприцепы и т.д.) объекты мелкорозничной сети и транспорт для перевозки пищевых продуктов проводится в соответствии с санитарными правилами и нормативами, регулирующими их деятельность (СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»).

2. Дезинфицирующее средство с моющим действием «ДЕЗОН D102» предназначено для:

- дезинфекции, совмещенной с мойкой (после предварительной механической очистки от пищевых остатков), на предприятиях продовольственной торговли и на транспорте для перевозки пищевых продуктов;

- дезинфекции после предварительной мойки предприятий продовольственной торговли и транспорта для перевозки пищевых продуктов моющими средствами, разрешенными для использования на предприятиях пищевой промышленности.

3. Дезинфекция поверхностей помещений, торгового (весов, прилавков, витрин, фасовочных агрегатов и др.) и технологического оборудования (фаршевых машин, пил, столов для разделки мяса, рыбы, решеток, стеллажей, подтоварников и т.д., раковин и производственных ванн), холодильного оборудования, тары, посуды, крупного (подтоварников, тележек, транспортеров) и мелкого инвентаря (лотков, подносов, ножей, разделочных досок), в отделах скоропортящихся продуктов (мясном, рыбном, молочном, колбасном, кулинарном, кондитерском и др.) проводится методом орошения, протирания или погружения (мелкий инвентарь) 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут, норма расхода средства 100-200 мл/м^2.

После обработки проводят влажную уборку

Дезинфекцию, совмещенную с мойкой, вышеперечисленных объектов проводят аналогично. Норма расхода средства - 100-300 мл/м^2.

4. Дезинфекция поверхностей помещений, торгового оборудования (платформ весов, прилавков, витрин, стеллажей, фасовочных агрегатов и др.), инвентарной тары, мелкого и крупного оборудования в бакалейных, хлебобулочных и пр. отделах проводится методом орошения, протирания или погружения (мелкий инвентарь) 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут, норма расхода средства 100-200 мл/м^2.

Дезинфекцию, совмещенную с мойкой, вышеперечисленных объектов проводят аналогично. Норма расхода средства - 100-300 мл/м^2.

После обработки проводят влажную уборку

Пищевое оборудование ополаскивают водой от остатков дезинфицирующего раствора в течение 3-5 минут.

5. Профилактическую, текущую и вынужденную дезинфекцию поверхностей помещений, стеллажей, инвентаря, тары на плодоовощных базах, складах, овоще- и фруктохранилищах для предупреждения развития гнилостных бактерий проводят после механической очистки 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут.

Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просушивают, а затем двукратно с интервалом 15 минут обрабатывают способом протирания или орошения 2% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 90 мин, 3% раствором при экспозиции 60 минут, 4% раствором при экспозиции 30 мин. Для предотвращения роста плесени через 1 месяц рекомендуется повторить обработку.

6. Дезинфекцию после предварительной мойки внутренней поверхности кузова транспорта для перевозки пищевых продуктов (включая охлаждаемый и изотермический транспорт) проводят 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут, норма расхода средства 100-200 мл/м^2.

Дезинфекцию, совмещенную с мойкой, вышеперечисленных объектов проводят аналогично. Норма расхода средства - 100-300 мл/м^2.

По окончании дезинфекции внутренняя поверхность кузова промывается водой из шланга, просушивается и проветривается. Дезинфекция транспорта производится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 10 дней.

7. Генеральную санитарную обработку предприятий продовольственной торговли проводят согласно внутреннему распорядку предприятия, но не реже одного раза в неделю. Дезинфекция в отделах скоропортящихся продуктов (мясном, рыбном, молочном, колбасном, кулинарном, кондитерском и др.) проводится 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут

Дезинфекция в бакалейных, хлебобулочных и пр. отделах проводится методом орошения, протирания или погружения (мелкий инвентарь) 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут

8. Туалеты по мере необходимости и после окончания работы предприятия тщательно очищают, промывают и дезинфицируют путем орошения 0,25%, 0,5%, 1%, 2% раствором средства. Норма расхода средства составляет 150-300 мл/м^2. Время дезинфекционной выдержки 60 мин., 30 мин., 15 мин., 5 мин. соответственно. При каждой уборке туалетов протирают отдельно выделенной салфеткой, смоченной в 0,25%, 0,5%, 1%, 2% растворе средства, вентили водопроводных кранов, а также ручки и затворы дверей, спусковые ручки и другие поверхности, которых касаются руки человека при посещении туалета.

9. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки, ветошь) замачивают в 1% рабочем растворе средства «ДЕЗОН D102» на 90 минут 2% рабочем растворе на 60 минут, 3% растворе на 30 минут, 4% растворе на 10 минут По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Дезинфекция в парикмахерских, салонах красоты, косметических и массажных салонах

1. Дезинфекцию поверхностей помещений, оборудования, инвентаря в парикмахерских, салонах красоты, косметических и массажных салонах, СПА-центрах проводят в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, регулирующими деятельность этих объектов (СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг").

2. Профилактическую дезинфекцию, совмещенную с мойкой, поверхностей помещений (пол, стены, плинтусы), дверей, мебели, поверхностей аппаратов и приборов парикмахерских залов, косметических кабинетов, массажных кабинетов и туалетных комнат, педикюрных и маникюрных кабинетов проводят 1% раствором средства при экспозиции 60 минут, 2% раствором средства при экспозиции 30 минут, 3% раствором средства при экспозиции 15 минут. Норма расхода средства 100-200 мл/м^2.

После обработки проводят влажную уборку.

3. Подушка, подкладываемая под ногу, при проведении педикюра протирается губкой, салфеткой или ветошью, смоченной 1% раствором средства при экспозиции 60 минут, 2% раствором средства при экспозиции 30 минут, 3% раствором средства при экспозиции 15 минут. Срок годности рабочих растворов – 50 суток.

4. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос моют и дезинфицируют в растворах средства 1%, 2%, 3% при экспозиции 60 минут и 30 минут, 15 минут соответственно.

5. Дезинфекцию и мойку, совмещенную с дезинфекцией, ванн для ног, ванночек для рук, душевых кабин, ванн, проводят после каждого клиента 1%, 2%, 3% раствором средства, нанесенным на губку, салфетку, ветошь или щетку. Экспозиция 60 минут, 30 минут, 15 минут соответственно. Срок годности рабочих растворов – 14 суток.

7. Дезинфекцию и мойку, совмещенную с дезинфекцией, соляриев проводят после каждого клиента 1%, 2%, 3% раствором средства, нанесенным на губку, салфетку, ветошь или щетку. Экспозиция 60 минут, 30 минут, 15 минут соответственно.

8. Дезинфекция и мойка поверхностей помещений и оборудования при проведении генеральных уборок в парикмахерских залах, косметических кабинетах, массажных кабинетах и туалетных комнатах, в педикюрных и маникюрных кабинетах проводят 1% раствором средства при экспозиции 60 минут, 2% раствором средства при экспозиции 30 минут, 3% раствором средства при экспозиции 15 минут.

9. Инвентарь, используемый для уборки всех помещений, педикюрного и маникюрного кабинета, погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки, ветошь) замачивают в 3% растворе средства на 120 минут, 4% растворе средства на 90 минут, 5% растворе средства на 60 минут. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.

10. Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек (маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, пилинг, скраб-пилинг косметические услуги) после каждого клиента необходимо сначала промыть в проточной воде, затем просушить и обработать дезинфицирующим раствором по режимам, применяемым при вирусных инфекциях (табл. 3). После окончания дезинфекции инструменты подвергают предстерилизационной очистке и стерилизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Дезинфекция в бассейнах и аквапарках

1. Дезинфекцию поверхностей помещений, оборудования, инвентаря и санитарную обработку плавательных ванн в бассейнах и аквапарках средством «ДЕЗОН D102» проводят в соответствии с санитарными правилами и нормативами, регулирующими их деятельность (СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.

Контроль качества» и СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков»).

2. Ежедневную профилактическую дезинфекцию или дезинфекцию, совмещенную с мойкой, поверхностей помещений туалетов, душевых, раздевальных, обходных дорожек, скамеек, лежаков, дверных ручек, поручней и прочего оборудования и инвентаря в бассейнах и аквапарках проводят способом протирания или орошения 1% раствором средства при экспозиции 60 минут, 2% раствором средства при экспозиции 30 минут, 3% раствором средства при экспозиции 15 минут. Норма расхода средства 100-200 мл/м^2.

После обработки проводят влажную уборку

3. Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просушивают, а затем двукратно с интервалом 15 минут обрабатывают способом протирания или орошения 2% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 90 мин, 3% раствором при экспозиции 60 минут, 4% раствором при экспозиции 30 мин. Для предотвращения роста плесени через 1 месяц рекомендуется повторить обработку.

4. Дезинфекция и мойка поверхностей помещений и оборудования при проведении генеральных уборок в бассейнах, аквапарках проводятся 1% раствором средства при экспозиции 60 минут, 2% раствором средства при экспозиции 30 минут, 3% раствором средства при экспозиции 15 минут.

5. Дезинфекция и дезинфекция, совмещенная с мойкой, ванн бассейнов, проводимая после полного слива воды и механической чистки, осуществляется 1%, 2%, 3% раствором средства способом двукратного орошения с расходом дезинфектанта 300 мл/м^2. Смыв дезинфицирующего раствора производится не ранее, чем через 60 минут и 30 минут, 15 минут соответственно.

6. Перед дезинфекционной обработкой обросших стенок ванн бассейнов рекомендуется их предварительно очистить с помощью кислотных моющих средств.

7. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки, ветошь) замачивают в 3% растворе средства на 120 минут, 4% растворе средства на 90 минут, 5% растворе средства на 60 минут. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.

8. Банные сандалии и тапочки из полимерных материалов дезинфицируют способом погружения в 1% растворе средства на 60 минут, 2% растворе средства на 30 минут, 3% растворе средства на 15 минут., препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

1. Дезинфекция на объектах банного обслуживания

1. Дезинфекцию и дезинфекцию, совмещенную с мойкой, поверхностей помещений, оборудования и инвентаря объектов банного обслуживания (бань, саун, санитарных пропускников, стационарных и передвижных обмывочно-дезинфекционных камер) проводят средством «ДЕЗОН D102» в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, регулирующими деятельность этих объектов (СапПиН № 982-72 «Устройство, оборудование и содержание бань»).

2. Дезинфекция или дезинфекция, совмещенная с мойкой, поверхностей (полов, стен, дверей), оборудования (скамеек, кранов и т.п.), инвентаря (тазов, ковшей и др., изготовленных из любых материалов) в мыльных, парильных, душевых и ванных залах проводится методом протирания или орошения с использованием щеток, губок, салфеток, ветоши, смоченных 1% раствором средства при экспозиции 60 минут, 2% раствором средства при экспозиции 30 минут, 3% раствором средства при экспозиции 15 минут. Норма расхода средства 100-200 мл/м^2. После окончания экспозиционной выдержки необходимо смыть дезинфицирующий раствор с полов, стен, дверей, скамеек, кранов водой с помощью шланга. Тазы также необходимо обмыть водой.

3. Дезинфекция или дезинфекция, совмещенная с мойкой, поверхностей (полов, стен, дверей), мебели (диванов, скамеек, кресел, шкафчиков, лежаков, столов и др.) и оборудования (массажных кресел, тренажерного оборудования) в релаксационных и раздевальных залах проводится методом протирания 1% раствором средства при экспозиции 60 минут, 2% раствором средства при экспозиции 30 минут, 3% раствором средства при экспозиции 15 минут.

4. Дезинфекцию и мойку, совмещенную с дезинфекцией, весов, ванн для ног, душевых кабин, ванн, проводят после каждого клиента 1% раствором средства при экспозиции 60 минут, 2% раствором средства при экспозиции 30 минут, 3% раствором средства при экспозиции 15 минут.

Срок годности рабочих растворов –14 суток.

5. Банные сандалии и тапочки из полимерных материалов дезинфицируют способом погружения в 1% растворе средства на 60 минут, 2% растворе средства на 30 минут, 3% растворе средства на 15 минут, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой.

6. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки, ветошь) замачивают в 3% растворе средства на 120 минут, 4% растворе средства на 90 минут, 5% растворе средства на 60 минут. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.

7. Дезинфекция и мойка поверхностей помещений и оборудования при проведении генеральных уборок на объектах банного обслуживания проводится 1% раствором средства при экспозиции 60 минут, 2% раствором средства при экспозиции 30 минут, 3% раствором средства при экспозиции 15 минут.

8. Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просушивают, а затем двукратно с интервалом 15 минут обрабатывают способом протирания или орошения 2% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 90 мин, 3% раствором при экспозиции 60 минут, 4% раствором при экспозиции 30 мин. Для предотвращения роста плесени через 1 месяц рекомендуется повторить обработку.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Дезинфекция в спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждениях, фитнес-клубах

1. Дезинфекция в физкультурно-оздоровительных, спортивных учреждениях и фитнес-клубах проводится в соответствии с нормативными документами, регулирующими их деятельность (ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования»).

2. Дезинфекция или дезинфекция, совмещенная с мойкой, поверхностей (полов, стен, дверей), мебели (диванов, скамеек, кресел, шкафчиков), спортивного оборудования (тренажерного оборудования), спортивного инвентаря, гимнастических ковриков в тренажерных, гимнастических, фитнес-залах и раздевальных залах проводится методом протирания или орошения 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут. После обработки проводят влажную уборку

3. Дезинфекция помещений и оборудования СПА-зоны (включая салоны красоты, парикмахерские, косметические и массажные кабинеты), проводится в соответствии с методикой, изложенной в Приложении 4.

4. Дезинфекция помещений и оборудования Аква-зоны (зоны бассейнов), проводится в соответствии с методикой, изложенной в Приложении 5.

5. Дезинфекция бань и саун, проводится в соответствии с методикой Приложения 6.

6. Дезинфекция и мойка поверхностей помещений, оборудования, инструментария и инвентаря при проведении генеральных уборок в тренажерных, гимнастических, раздевальных, фитнес-залах, СПА-зонах проводится 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут; в аква-зоне, в банях и саунах –1% раствором средства при экспозиции 60 минут, 2% раствором средства при экспозиции 30 минут, 3% раствором средства при экспозиции 15 минут

7. Туалеты по мере необходимости и после окончания работы спортивного учреждения тщательно очищают, промывают и дезинфицируют способом орошения 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут.

8. Ежедневную профилактическую дезинфекцию или дезинфекцию, совмещенную с мойкой душевых, проводят способом протирания или орошения 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут. Норма расхода средства 100-200 мл/м^2. Смывание раствора с поверхностей после каждой обработки не требуется.

9. Инвентарь, используемый для уборки в тренажерных, гимнастических, раздевальных, фитнес-залах, СПА-зонах, погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки, ветошь) замачивают в 1% рабочем растворе средства «ДЕЗОН D102» на 90 минут 2% рабочем растворе на 60 минут, 3% растворе на 30 минут, 4% растворе на 10 минут По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Дезинфекция, мойка и дезодорирование систем мусороудаления жилых, административных и общественных зданий

1. Перед дезинфекцией мусоропровода на всех этажах закрывают мусороприемные клапаны; на них размещается табличка с предупреждающей надписью о проведении очистки, мойки, дезинфекции и временном запрете на пользование мусоропроводом.

2. После этого из ствола мусоропровода, мусороприемной камеры удаляют остатки мусора и осуществляют прочистку ствола мусоропровода путем опускания и подъема щеточного узла с грузом – не менее 3-х циклов. Данная операция осуществляется без подачи воды и рабочего раствора дезинфицирующего средства в ствол мусоропровода.

3. Далее осуществляют мойку мусоропровода, производя опускание и подъем щеточного узла с непрерывной подачей горячей воды на внутреннюю поверхность ствола мусоропровода посредством кольцевого душа. Необходимо проводить не менее 4-х циклов мойки ствола мусоропровода.

4. Дезинфекция ствола мусоропровода проводится после его очистки и мойки путем подачи рабочего раствора средства на внутреннюю поверхность ствола с одновременным опусканием (подъемом) щеточного узла. При проведении орошения 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут. Норма расхода средства составляет 100-300 мл/м^2, начальная температура рабочего раствора – 30-50^{0}С, в дальнейшем температура рабочего раствора не поддерживается. Выполняется не менее 2-х циклов.

5. Приготовление рабочего раствора дезинфицирующего средства должно осуществляться специальным устройством, входящим в состав механизма прочистки, промывки и дезинфекции.

6. По окончании времени воздействия дезинфицирующего средства на ствол мусоропровода он просушивается с помощью естественной или принудительной вентиляции (после завершения процесса ствол мусоропровода должен быть сухим).

7. После очистки, мойки и дезинфекции ствола мусоропроводов приступают к очистке, мойке и дезинфекции мусороприемной камеры, загрузочных клапанов, тележек для вывоза мусора, мусоросборников (контейнеров) и площадок на которых они установлены. Обеззараживание мусороприемной камеры, загрузочных клапанов, мусоросборников (контейнеров) и площадок, на которых они установлены, включает в себя:

- орошение рабочим раствором дезинфицирующего средства стен, пола и шибера в мусоросборной камере;
- обработку (после их предварительной очистки от загрязнений) внутренней и наружной поверхностей загрузочного клапана, мусоросборников (контейнеров);
- орошение поверхностей площадок, на которых установлены мусоросборники (контейнеры), и их ограждений.

Дезинфекция указанных элементов системы мусороудаления осуществляется 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут. Норма расхода средства составляет 150-300 мл/м^2.

8. Дезинфекция металлических мусоросборников (контейнеров) в летний период осуществляется раз в 10 дней – при «несменяемой» системе вывоза, и после каждого опорожнения контейнера - при «сменяемой» системе вывоза твердых бытовых отходов.

9. Уборочный инвентарь (щетки, метлы, швабры и т.д.) по окончании работы погружают в раствор средства, материал (ветошь) замачивают в 1% рабочем растворе средства «ДЕЗОН D102» на 90 минут 2% рабочем растворе на 60 минут, 3% растворе на 30 минут, 4% растворе на 10 минут. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Консервация и обеззараживание содержимого накопительных баков автономных и мобильных туалетов. Дезинфекция, мойка и дезодорирование поверхностей автономных и мобильных туалетов

1. Обеззараживание содержимого накопительных баков автономных туалетов средством «ДЕЗОН D102».

1.1. Все операции по заправке и очистке автономных и мобильных туалетов производятся в соответствии с действующими руководствами и регламентами технического обслуживания для данного типа туалета.

1.2. Рабочий раствор средства может быть приготовлен в отдельной емкости, из которой он отбирается для заправки цистерн спецавтотранспорта, или на местах потребления непосредственно в баке туалета при его заправке.

1.3. Для приготовления рабочего раствора необходимое количество средства вливают в отмеренное количество водопроводной воды и перемешивают. Для удобства приготовления растворов могут применяться дозирующие системы различных модификаций.

1.4. Заправка баков рабочим раствором может производиться как вручную, так и с помощью спецавтомашин. Технология и способ заправки предусмотрены регламентом обслуживания и технической документацией для данного типа туалетов.

1.5. Заполнение отходами не должно превышать 75% общего объема бака-сборника, для дачных биотуалетов объемом 21 л и 12 л – не более 90%. Для обеззараживания содержимого баков-сборников применяется 1,5% или 2,5% раствор средства. Количество заливаемого раствора и объема отходов должно

быть в соотношении 1:10. При таком соотношении обеззараживание отходов после заполнения бака обеспечивается соответственно через 90 или 60 минут (экспозиция обеззараживания).

1.6. Удаление фекальной массы из баков производится ассенизационной машиной не ранее, чем через 90 или 60 минут после внесения, соответственно, 1,5% или 2,5% рабочего раствора средства.

1.7. В таблице 1 данного Приложения приведены расчетные количества средства и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора непосредственно в баке туалета в зависимости от емкости бака.

Таблица 1. Приготовление растворов средства «ДЕЗОН D102» в накопительном баке туалета для обеззараживания содержимого накопительных баков.

Емкость бака, л	Количество средства «ДЕЗОН D102» и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора			
	1,5%		2,5%	
	Средство, мл	Вода, л	Средство, мл	Вода, л
300	340	22	570	21,5
250	280	18,5	470	18,5
200	230	14,5	380	14,5
150	170	11	280	11
100	120	7,5	200	7,5
50	50	3,5	100	3,5
21	25	1,5	40	1,5
12	15	0,8	25	0,8

2. Обеззараживание остатков экскрементов и мытье накопительных баков.

2.1. После опорожнения накопительных баков производят обеззараживание и удаление остатков фекально-мочевой смеси и промывку внешних и внутренних поверхностей баков.

2.2. Перед обеззараживанием из накопительных баков выкачивают содержимое, в бак заливают средство «ДЕЗОН D102», затем доливают водой до заполнения объема бака. Полученный раствор выдерживается в баке в течение времени, необходимого для обеззараживания остаточного количества фекально-мочевой смеси, затем отработанный раствор сливается в канализационную систему. Для более эффективной очистки целесообразно после слива отработанного раствора промыть баки водой. В таблице 2 данного Приложения представлены расчетные количества средства в зависимости от объема и степени загрязнения бака.

Таблица 2. Режимы обеззараживания остаточных количеств фекально-мочевой смеси рабочими растворами средства «ДЕЗОН D102», приготовленными непосредственно в накопительных баках

Объем бака, л	Концентрация рабочего раствора, %	Количество средства, мл	Время обеззараживания, мин
Баки, содержащие 2% и более остатков фекально-мочевой смеси			
300	0,1	300	40
300	0,2	600	20
250	0,1	250	40
250	0,2	500	20
100	0,1	100	40
100	0,2	200	20
50	0,1	50	40
50	0,2	100	20
21	0,1	21	40
21	0,2	42	20
12	0,1	12	40
12	0,2	24	20
Баки, содержащие менее 2% остатков фекально-мочевой смеси			
300	0,1	300	40
300	0,2	600	20
250	0,1	250	40
250	0,2	500	20
100	0,1	100	40
100	0,2	200	20
50	0,1	50	40
50	0,2	100	20
21	0,1	20	40
21	0,2	40	20
12	0,1	12	40
12	0,2	24	20

2.3. Промывку баков можно также производить способом орошения с помощью шланга готовым 0,25% раствором средства, подаваемым из отдельной емкости, из расчета 150-300 мл рабочего раствора на 1 м^2.

2.4. Внешнюю поверхность баков, поверхности в кабинах автономных туалетов обрабатывают 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут.

2.5. Мойку, дезинфекцию и дезодорирование бытовых (дачных) биотуалетов проводят после каждого опорожнения накопительного бака и перед длительным хранением. Поверхности баков обрабатывают способом протирания или орошения 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут.

2.6. Поверхности в кабинах автономных туалетов, ручки дверей, спусковые механизмы и т.д., обрабатываются 0,25% раствором средства «ДЕЗОН D102» при экспозиции 60 мин., 0,5% раствором средства при экспозиции 30 минут, 1% раствором средства при экспозиции 15 минут или 2% раствором средства при экспозиции 5 минут.

3. Применение средства для консервации отходов.

3.1. Для консервации отходов в чистый накопительный бак туалета перед его эксплуатацией наливают 10 мл концентрата средства «ДЕЗОН D102» и 0,5 л воды на каждые 10 л емкости бака (таблица 3 данного Приложения). После заполнения бака отходами на 75% емкости бака производят опорожнение бака и его дезинфекцию в соответствии с п.1 настоящего Приложения.

Таблица 3. Приготовление растворов для консервации отходов

Объем бака, л	12	21	50	100	150	200	250	300
Кол-во средства, мл	10	20	50	100	150	200	250	300
Кол-во, воды, л	0,5	1,0	2,5	5	7,5	10	12,5	15

4. Заправка смывного бачка биотуалета, дезодорирование экскрементов и обеззараживание поверхности унитаза при смыве.

4.1. Дезодорирование экскрементов и обеззараживание поверхностей унитазов рабочими растворами средства «ДЕЗОН D102», подаваемыми из смывного бачка, проводится 0,25% рабочим раствором дезинфектанта.

4.2. Для приготовления рабочего раствора в смывной бачок заливают средство «ДЕЗОН D102» в количестве, соответствующем объему бачка, затем добавляют воду до заполнения бачка. Расчеты для приготовления смывных рабочих растворов представлены в таблице 4 данного Приложения.

Таблица 4. Приготовление рабочих растворов «ДЕЗОН D102» для смыва фекально-мочевой смеси

Объем бачка, л	Концентрация рабочего раствора, %	Количество средства, мл
50	0,1	50
25	0,1	25
15	0,1	15
10	0,1	10

Внимание! Во избежание снижения эффективности не смешивать средство с бытовыми моющими средствами и мылами. Допускается использование моющих средств и добавок на основе неионогенных ПАВ.